Инструкция по применению
Танаксол 42 гр гранулы

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: Биолит
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки Танаксол создаются на основе лекарственных трав и натуральных экстрактов. Это позволяет использовать средство не только по основному назначению, против лямблий, но и для профилактики широкого спектра глистных инвазий, а также для укрепления организма в процессе лечения основным препаратом. И все же не стоит принимать комплекс без рекомендаций лечащего врача, потому что, как и любое другое средство от паразитов, Танаксол имеет свои противопоказания и побочные действия.

Состав

Биологически активные вещества экстрактов травы пижмы (эфирное масло, камфора, флавоноиды танацетин и танацетол), корневищ и корней девясила (эфирное алантовое масло – 1–3%, инулин – до 44%, тритерпеновые сапонины), травы тысячелистника (ахиллен, витамин К, сесквитерпены, полисахариды, эфирное масло хамазулен, дубильные вещества, сапонины, микроэлементы).

Форма выпуска

Гранулы

Способ применения и дозы

Взрослым – по 2 г (1 чайная ложка без верха) 2 раза в день во время еды в течение 4 недель. Больным лямблиозом при патологии желчевыводящей системы (дискинезии, холециститы) перед приемом танаксола рекомендуется на протяжении 1–2 недель принимать гепатопротективные средства липроксол или гепатосол. После проведения дегельминтизации необходим курс реабилитационной терапии: для улучшения функционального состояния желудочно-кишечного тракта рекомендуется прием экстракта подорожника в течение месяца, для улучшения функций гепатобилиарной системы – прием липроксола или гепатосола по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды в течение месяца, прием флоренты, разведенной в 5 – 10 раз, по 1 столовой ложке 2 раза в день после еды. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.