Инструкция по применению
Таржифорт Суппозитории вагинальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидрокортизона ацетат+Метронидазол+Натамицин+Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг+200 мг+150 мг+15 мг

Описание

Суппозитории цилиндроконической формы от светло-желтого с бежевым или кремовым оттенком до желтого с бежевым или кремовым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Гидрокортизона ацетат+Метронидазол+Натамицин+Хлорамфеникол

Состав

Состав на 1 суппозиторий: действующие вещества: метронидазол 500,0 мг, хлорамфеникол 200,0 мг, натамицин 150,0 мг, гидрокортизона ацетат 15,0 мг. вспомогательные вещества (основа для суппозиториев): полусинтетические глицериды (Суппоцир АМ) 1635,0 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Метронидазол При интравагинальном применении метронидазол абсорбируется в системный кровоток (около 20%). Максимальная концентрация метронидазола в крови определяется через 6-12 часов и составляет примерно 50% от максимальной концентрации, которая достигается (через 1-3 часа) после однократного приема эквивалентной дозы метронидазола внутрь. Метронидазол связывается с белками плазмы крови менее 20%. Метронидазол метаболизируется в печени, гидроксильные метаболиты активны. Активность основного метаболита (2-оксиметронидазол) составляет 30% активности исходного соединения. Метронидазол и окисленные метаболиты выводятся преимущественно через почки (20% в неизмененном виде) и в меньшей степени через кишечник. Проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, проникает в грудное молоко. Натамицин при интравагинальном применении не абсорбируется со слизистых оболочек. Фармакокинетика хлорамфеникола при интравагинальном применении не изучалась. Гидрокортизон при интравагинальном применении практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища, концентрация в плазме ниже уровня определения.

Показания

Вульвовагиниты: бактериальный, кандидозный, трихомонадный и/или в ассоциации со смешанной флорой, чувствительной к компонентам препарата, неспецифический вагинит, профилактика урогенитальных инфекций перед гинекологическими оперативными вмешательствами, диагностическими процедурами и установкой внутриматочного контрацептива.

Способ применения и дозы

Интравагинально, 1 суппозиторий перед сном в течение 10 дней. Суппозиторий (предварительно освободив от контурной упаковки) следует вводить глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, после гигиенической обработки наружных половых органов. Повторные курсы лечения возможны после консультации с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по медицинскому применению.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени, почек, беременность, период грудного вскармливания, ТАРЖИФОРТ® не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Учитывая незначительную системную абсорбцию, риск возникновения побочных действий минимальный. Местные реакции: ощущение жжения, боль, раздражение и отек в месте введения, эритема, сухость влагалища, особенно в начале лечения, которые не требуют прекращения лечения и определены влиянием препарата на раздраженную слизистую оболочку влагалища. Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы: снижение количества лейкоцитов крови (лейкопения), со стороны иммунной системы: сыпь, зуд кожных покровов, крапивница, анафилактические реакции, со стороны психического статуса: тревожность, лабильность настроения. со стороны нервной системы: головная боль, при длительном применении препарата – периферическая невропатия (ощущение онемения и покалывания (парестезии), судороги, тремор, со стороны вестибулярного аппарата: двигательные нарушения (атаксия), головокружение, со стороны желудочно-кишечного тракта: боль или спазмы в животе, «металлический» привкус во рту, изменение вкуса, сухость во рту, запор, диарея, потеря аппетита, тошнота, рвота. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции по применению или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При интравагинальном введении препарата в соответствии с инструкцией по применению (в терапевтических дозах) передозировка маловероятна. При чрезмерном применении или случайном приеме внутрь, возможные симптомы, обусловленные передозировкой метронидазола: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, «металлический» привкус во рту, двигательные нарушения (атаксия), головная боль, головокружение, ощущение онемения и покалывания (парестезии), судороги, снижение количества лейкоцитов крови (лейкопения), темное окрашивание мочи. Лечение: при случайном приеме внутрь (при необходимости) промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с пероральными антикоагулянтами (например, варфарин) возможно повышение концентрации антикоагулянтов в плазме, усиление эффекта и, следовательно, риска кровотечений, необходимо контролировать уровень протромбина и проводить мониторинг протромбинового времени, необходимо корректировать дозу пероральных антикоагулянтов во время лечения и в течение одной недели после прекращения лечения. При одновременном применении с препаратами лития может вызвать повышение токсичности последних. При одновременном применении с циклоспорином может вызвать повышение концентрации циклоспорина в плазме. При одновременном применении с дисульфирамом может вызвать психотические реакции (приступы делирия, спутанное сознание), не следует назначать больным, которые принимали дисульфирам в течение последних 2-х недель. При одновременном применении с лекарственными средствами, содержащими этанол, или при употреблении этанола возможно развитие дисульфирамоподобных реакций (чувство жара, покраснение кожи лица, рвота, тахикардия). При одновременном применении с бусульфаном может повыситься концентрация бусульфана в плазме крови. При одновременном применении с фенобарбиталом снижается уровень метронидазола в крови. При одновременном применении с циметидином может повыситься уровень метронидазола в крови. Если Вы применяете вышеперечисленные препараты, перед применением препарата ТАРЖИФОРТ® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат предназначен только для интравагинального применения, не применять другим способом. Во время лечения препаратом ТАРЖИФОРТ® рекомендуется воздерживаться от половых контактов. В случае инфицирования полового партнера и для исключения возможности реинфекции одновременное лечение обоих партнеров является обязательным. В случае трихомонадного вагинита совместно с местным лечением следует применять лекарственные средства, обладающие системным действием (например, метронидазол, таблетки). В случае применения препарата ТАРЖИФОРТ® совместно с метронидазолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе, необходим контроль картины периферической крови (опасность лейкопении). При выявлении снижения количества лейкоцитов лечение необходимо прекратить. При появлении во время лечения двигательных нарушений, головокружения, спутанности сознания, парестезий или судорог, лечение необходимо прекратить. Во время лечения и в течение 48 часов после прекращения лечения, следует воздержаться от приема этанола (алкоголя) или лекарств, которые содержат этанол. Применение суппозиториев может снижать надежность механической контрацепции (латекс-содержащие презервативы и вагинальные диафрагмы) – риск разрыва латекса. Метронидазол, входящий в состав препарата, способен иммобилизировать трепонемы, что приводит к ошибочному положительному тесту Нельсона. При появлении первых симптомов гиперчувствительности или сильного раздражения лечение необходимо прекратить. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Возможное негативное влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами не может быть исключено, поэтому при лечении препаратом необходимо соблюдать осторожность. При появлении побочных эффектов со стороны центральной нервной системы следует воздержаться от управления автотранспортом.

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.