Инструкция по применению
Тауфон капли глазные 4% 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Таурин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 4%



Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Действующее вещество

Таурин

Состав

1 мл раствора содержит: Активное вещество: таурин - 40 мг Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 1 мг 1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0 - 6,5 вода для инъекций до 1 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания

Препарат назначают взрослым при: Дистрофиях роговицы, Старческих, травматических, лучевых и других видах катаракт, Травмах роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов), Первичной открытоугольной глаукоме в сочетании с #-адреноблокаторами (для улучшения оттока водянистой влаги). При всех показаниях препарат применяется в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

При катарактах Тауфон назначают в виде инсталляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение трех месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом. При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение одного месяца. При открытоугольной глаукоме (в сочетании с бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазолом и его комбинированными формами или тимололом) - по 1-2 капли 2 раза в день, за 15-20 мин до назначения одного из гипотензивных средств, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к таурину, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение Тауфона для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Побочные действия

Аллергические реакции. Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительное усиление гипотензивного действия #-адреноблокаторов (тимолола и бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола) в случае совместного применения с Тауфоном. Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги.

Срок хранения после открытия

Срок годности препарата после вскрытия - 1 месяц. Не применять после окончания срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С, в защищенном от света, недоступном для детей месте.