Инструкция по применению
Таурин-Реневал Капли глазные 4 % 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Таурин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 4%

Описание

Прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость.

Действующее вещество

Таурин

Состав

Действующее вещество:Таурин # 40 мгВспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат # 1 мггидроксиэтилцеллюлоза # 2 мгвода для инъекций # до 1 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания

Препарат применяют в составе комплексной терапии при дистрофии роговицы, катаракте (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая), травме роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с местными -адреноблокаторами (для улучшения оттока внутриглазной жидкости).

Способ применения и дозы

При катаракте препарат назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом. При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.При открытоугольной глаукоме (в сочетании с местными #-адреноблокаторами) по 1-2 капли 2 раза в день за 15-20 минут до назначения одного из местных #-адреноблокаторов, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ препарата, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Отсутствуют достаточные сведения о безопасности применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания. Возможно применение таурина для лечения во время беременности и в период грудного вскармливания по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов для плода и ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции.Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно совместное применение таурина с тимололом. Случаев негативного лекарственного взаимодействия таурина с другими препаратами, применяющимися в офтальмологии, не описано.У пациентов с первичной открытоугольной глаукомой отмечено увеличение гипотензивного действия -адреноблокаторов (бутиламиногидроксипропоксифенокси-метил метилоксадиазола или тимолола и других) в случае совместного применения с таурином.

Особые указания

Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 минут после него. При необходимости одновременного применения других офтальмологических лекарственных средств (глазные капли и другие), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.После вскрытия использовать в течение 90 суток.

Условия хранения

В пачке при температуре не выше 25° С.Хранить в недоступном для детей месте.