Инструкция по применению
Таустин капли глазные 4% 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Таурин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 4%

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Действующее вещество

Таурин

Состав

1 мл препарата содержит: Активное вещество: ,таурин - 40 мг. Вспомогательное вещество: ,вода для инъекций - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания

Препарат применяют в составе комплексной терапии. Дистрофия роговицы; Катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая); травма роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов); Первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с бета-адреноблокаторами (для улучшения оттока внутриглазной жидкости)).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Назначение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительное усиление гипотензивного действия бета-адреноблокаторов (бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола или тимолола малеата) в случае совместного применения с таурином. Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги.

Особые указания

При необходимости одновременного использования других офтальмологических лекарственных препаратов (глазные капли и др.), интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Консервант, содержащийся в препарате, может оказывать раздражающее действие на глаз при ношении контактных линз, поэтому любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием и надевать не ранее, чем через 15 мин после него. Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами: Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.