Инструкция по применению
Теймурова Паста 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Паста
Страна: Россия
Производитель: Зеленая Дубрава
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Борная кислота+Метенамин+Тальк+Натрия тетраборат+Салициловая кислота+Свинца ацетат+Формальдегид+Цинка оксид
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородная паста белого или белого со слегка желтоватым или сероватым оттенком цвета, мятного запаха.

Действующее вещество

Борная кислота+Метенамин+Тальк+Натрия тетраборат+Салициловая кислота+Свинца ацетат+Формальдегид+Цинка оксид

Состав

100 г пасты содержат: Действующие вещества: борная кислота - 7,0 г, салициловая кислота - 1,4 г, цинка оксид - 25,0 г, натрия тетрабората декагидрат - 7,0 г, тальк - 25,0 г, метенамин (гексаметилентетрамин) - 3,5 г, формальдегид (формальдегида раствор, формалин) - 3,5 г, свинца ацетата тригидрат - 0,3 г. Вспомогательные вещества: глицерол (глицерин) - 12,0 г, мяты перечной листьев масло (масло мяты перечной) - 0,3 г, моноглицериды дистиллированные - 3,0 г, вода очищенная - 12,0 г.

Форма выпуска

Паста

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Потливость, опрелость, гипергидроз стоп.

Способ применения и дозы

Наружно взрослым и детям после 16 лет. Полоса пасты диаметром 5 мм и длиной 1 см имеет массу около 0,5 г. Перед применением препарата следует вымыть ноги и (или) другие потеющие места и тщательно высушить, а затем нанести пасту из расчета 0,5 г на 1 см2 на кожу стоп или на участки потливости и аккуратно втирать в течение 1-3 мин, излишки пасты снять салфеткой. Процедуру проводят 1 раз в сутки в течение 3-4 дней. По мере необходимости курс можно повторить через 3-4 недели.

Противопоказания

Детский возраст до 16 лет, беременность, период грудного вскармливания, заболевания почек, повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания кожи стоп, раны на коже.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны покраснение и чувство жжения, которые проходят через несколько минут самостоятельно и не требуют отмены препарата, возможны аллергические реакции - кожная сыпь, ангионевротический отек.

Передозировка

Маловероятна, поскольку препарат всасывается незначительно и системного действия не оказывает.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания

Не наносить препарат на слизистые оболочки и поврежденную кожу, на обширные поверхности тела, не превышать указанных доз препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами и т.п.).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.