Инструкция по применению
Телектол-OBL таблетки покрытые оболочкой 5мг N50



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Оболенское ФП
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Винпоцетин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 5 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Винпоцетин

Состав

Винпоцетин 5 мг Вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный, лактоза, кополивидон, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил), гипромеллоза, макрогол, титана диоксид, краситель.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Всасывание После приема препарата внутрь винпоцетин быстро абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность составляет около 60%. Cmax достигается через 1 ч. Легко проникает через гистогематические барьеры (в т.ч. через ГЭБ) и проникает в ткани. Выведение T1/2 составляет около 5 ч.

Показания

— острые (после окончания курса парентерального введения винпоцетина, а также при невозможности парентерального введения) и хронические формы недостаточности мозгового кровообращения (в т.ч. острая и резидуальная стадии инсульта, транзиторные ишемические атаки, энцефалопатии, мультиинфарктная деменция); — сосудистые заболевания сетчатки и/или сосудистой оболочки глаза (вследствие атеросклероза, ангиоспазма, тромбоза); — дегенеративные изменения желтого пятна глаза, вызванные атеросклерозом или ангиоспазмом; — вторичная глаукома (вследствие обтурации сосудов); — возрастные сосудистые или токсические (медикаментозные) нарушения слуха; — болезнь Меньера; — головокружения лабиринтного происхождения; — вегетативные проявления климактерического синдрома.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать внутрь по 5-10 мг 3 раза/сут в течение 2 мес. Перед отменой препарата следует постепенно снижать дозу. Возможны повторные курсы 2-3 раза в год.

Противопоказания

— выраженные нарушения сердечного ритма; — ИБС (тяжелое течение); — острая стадия геморрагического инсульта; — беременность; — период лактации (грудное вскармливание); — повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, тахикардия, экстрасистолия, замедление внутрижелудочковой проводимости.

Передозировка

Лечение: при передозировке - промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При применении Телектола на фоне гепаринотерапии повышается риск развития геморрагических осложнений.

Условия хранения

В сухом месте