Инструкция по применению
Темпалгин Таблетки 500 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метамизол натрия+Триацетонамин-4-толуолсульфонат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 500 мг+20 мг
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Метамизол натрия+Триацетонамин-4-толуолсульфонат

Состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, состав (1 табл.):активные вещества: метамизол натрия моногидрат — 500 мгтриацетонамин-4-толуолсульфонат — 20 мгвспомогательные вещества: крахмал пшеничный — 95 мг; МКЦ — 75 мг; повидон К25 — 45 мг; тальк — 15 мг; магния стеарат — 10 мгоболочка пленочная: Opadry II зеленый 85 F 21526 — 23 мг: поливиниловый спирт частично гидролизованный — 9,2 мг; макрогол 3350 — 4,646 мг; тальк — 3,404 мг; титана диоксид (Е171) — 4,37 мг; хинолиновый желтый (Е104) алюминиевый лак — 1,035 мг; бриллиантовый голубой (Е133) FCF алюминиевый лак — 0,345 мг

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Темпалгин - анальгетик-антипиретик комбинированного состава.Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, слабо выраженное противовоспалительное и седативное действие.В состав препарата входят неопиоидный анальгетик метамизол натрий и анксиолитик (транквилизатор) темпидон.

Способ применения и дозы

- Болевой синдром (головная боль, невралгия, зубная боль, мигрень, миалгия, альгодисменорея, артралгия);- висцеральные боли (почечная, кишечная, печеночная колика) для потенцирования эффекта спазмолитиков;- слабый или умеренный болевой синдром после диагностических или хирургических вмешательств.

Противопоказания

Внутрь, после еды, запивая водой.Доза зависит от выраженности боли и индивидуальной чувствительности к препарату.Взрослые: обычная доза — по 1 табл. 1–3 раза в день. Максимальная разовая доза не должна превышать 1 табл. Максимальная суточная доза составляет 4 табл.При стоматологических процедурах: по 1 табл. за 30 мин до вмешательства.Дети старше 15 лет: по 1 табл. в день. Максимальная суточная доза — 2 табл.Особые группы пациентовПациенты старше 65 лет. Обычно не требуется уменьшение дозы. У пациентов с возрастными нарушениями функций почек и печени лечение препаратом Темпалгин должно быть непродолжительным. Максимальная суточная доза — 2 табл.Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени возможно увеличение T1/2 метаболитов метамизола натрия. У пациентов с умеренными или тяжелыми поражениями печени рекомендуется лечение 1/2 рекомендуемой дозы для взрослых (максимальная суточная доза — 2 табл.).Нарушение функции почек. Метамизол натрия и его метаболиты выводятся почками. У пациентов с поражением функции почек лечение препаратом Темпалгин следует проводить, используя 1/2 рекомендуемой дозы для взрослых (максимальная суточная доза — 2 табл.).Продолжительность леченияЛечение препаратом Темпалгин не должно длиться более 3–5 дней. Его применение более в длительный период времени или в более высоких дозах возможно только после консультации с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Симптомы: тошнота, рвота, боли в эпигастрии, олигурия, тахикардия, снижение АД, одышка, шум в ушах, сонливость, нарушение сознания, судороги.Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных и активированного угля ; в тяжелых случаях - гемодиализ, форсированный диурез, симптоматическая терапия, при развитии судорожного синдрома - в/в введение диазепама и быстродействующих барбитуратов.

Побочные действия

Меры предосторожности

Передозировка

Темпалгин усиливает эффекты этанола.Одновременное применение Темпалгина с хлорпромазином или другими производными фенотиазина может привести к развитию выраженной гипертермии.Седативные средства и транквилизаторы усиливают анальгезирующее действие препарата.При одновременном применении тиамазол и цитостатики повышают риск развития лейкопении.При одновременном применении метамизол натрия с циклоспорином снижается концентрация последнего в плазме крови.Метамизол натрия, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемические препараты, непрямые антикоагулянты, ГКС и индометацин, увеличивает их действие.При одновременном применении барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизол натрия.Одновременное применение метамизол натрия с другими неопиоидными анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, пероральными контрацептивами, аллопуринолом может привести к взаимному усилению токсических эффектов.Кодеин, блокаторы гистаминовых Н 2 -рецепторов и пропранолол замедляют выведение метамизол натрия и усиливают его действие.

Взаимодействие с другими препаратами

повышенная чувствительность к компонентам препарата,выраженная почечная /печеночная недостаточность,хроническая сердечная недостаточность,артериальная гипотензия (сАД ниже 100 мм рт. ст.),угнетение кроветворения (гранулоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, цитостатическая или инфекционная нейтропения), дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,«аспириновая» астма,детский возраст (до 14 лет).С осторожностью назначают при заболеваниях почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, в т.ч. в анамнезе), печеночной/почечной недостаточности умеренной степени тяжести, при бронхиальной астме, предрасположенности к развитию артериальной гипотензии, при длительном злоупотреблении алкоголем.

Особые указания

чувство жжения в эпигастрии,сухость во рту,холестаз,желтуха,повышение уровня трансаминаз,гипербилирубинемия

Условия хранения

В сухом месте