Инструкция по применению
Теофедрин-Н Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Белладонны листьев экстракт + Кофеин + Парацетамол + Теофиллин + Фенобарбитал + Цитизин + Эфедрин
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36

Описание

Таблетки белого с коричневым оттенком цвета, с вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Действующее вещество

Белладонны листьев экстракт + Кофеин + Парацетамол + Теофиллин + Фенобарбитал + Цитизин + Эфедрин

Состав

Одна таблетка содержит: _Действующие вещества:_ Парацетамол (в пересчете на 100 % безводное вещество) - 200,0 мг Теофиллин (в пересчете на 100 % безводное вещество) - 100,0 мг Кофеин (в пересчете на 100 % безводное вещество) - 50,0 мг Фенобарбитал (в пересчете на 100 % безводное вещество) - 20,0 мг Эфедрина гидрохлорид (в пересчете на 100 % безводное вещество) - 20,0 мг Красавки экстракт густой - 3,0 мг Цитизин (в пересчете на 100 % безводное вещество) - 0,1 мг _Вспомогательные вещества:_ Крахмал картофельный - 192,7 мг Кальция стеарат - 2,0 мг Кислота стеариновая - 0,2 мг Поливинилпирролидон низкомолекулярный (Повидон К-17) - 12,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь как лечебное и профилактическое средство. Для купирования приступов бронхиальной астмы как вспомогательное средство принимают однократно по 2 таблетки Теофедрина-Н®. При необходимости, препарат применяют 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 3 таблетки. Профилактически Теофедрин-Н® принимают внутрь по 1/2-1 таблетки 1 раз в день, после еды. Во избежание нарушения ночного сна препарат принимают утром или днем. Длительность применения препарата зависит от характера, особенностей течения заболевания и оказываемого терапевтического эффекта.

Противопоказания

* Гиперчувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ. * Хроническая сердечная недостаточность. * Стенокардия. * Нарушение коронарного кровообращения. * Нарушения ритма сердца. * Закрытоугольная глаукома. * Гиперплазия предстательной железы. * Гипертиреоз. * Артериальная гипертензия. * Эпилепсия и другие судорожные состояния. * Беременность. * Лактация. * Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Теофедрин-Н® противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Передозировка

Симптомы Признаки острого отравления: тошнота, рвота, боли в желудке, бессонница, эпилептоидные припадки, нарушение зрения. Эфедрин, принимаемый в высоких дозах, приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Летальная пероральная доза эфедрина составляет 1 грамм. Передозировка, обусловленная парацетамолом (с развитием гепатонекроза, повышением активности «печеночных» трансаминаз и увеличением протромбинового времени) проявляется после приема свыше 10 - 15 грамм парацетамола и маловероятна из-за наличия в составе препарата других активных компонентов. _Лечение_ Промывание желудка, искусственная рвота, симптоматическая терапия.

Особые указания

Во избежание нарушения ночного сна препарат не следует принимать вечером. С осторожностью препарат применяют у больных с нарушенной функцией печени и/или почек. Во избежание токсического поражения печени препарат не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, также принимать лицам, склонным к хроническому употреблению алкоголя. Не рекомендуется назначать препарат больным с сахарным диабетом, поскольку эфедрин, применяемый в дозах, превышающих терапевтические, повышает обмен веществ, приводя таким образом, к повышению глюкозы в крови. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Раздел III Перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.