
Инструкция по применению
Теоритин МФ Таблетки 4 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обнинская химико-фармацевтическая компания
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бензгидрилпиперазинилбутилметилксантина сукцинат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 4 мг

Описание

Таблетки от белого до белого со светло-коричневым оттенком цвета плоскоцилиндрической формы с фаской с двух сторон.

Действующее вещество

Бензгидрилпиперазинилбутилметилксантина сукцинат

Состав

Действующее вещество: Бензгидрилпиперазинилбутилметилксантина сукцинат (теоритин) в пересчете на 100 % вещество - 4 мг Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая - 149,6 мг Карбоксиметилкрахмал натрия - 4,8 мг Кальция стеарат - 1,6 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция. Препарат Теоритин® МФ практически полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте, относительная биодоступность составляет около 95 % после приема 5 мг препарата. Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается через 3 ± 1.3 часа и составляет 2.04 ± 0.89 нг/мл. Площадь под кривой концентрация-время (AUC0-∞) составляет 26.56 ± 13.06 нг*ч/мл. Распределение. Препарат Теоритин® МФ наиболее интенсивно распределяется в хорошо васкуляризированных органах (печень, селезенка, легкие, почки), несколько в меньшей степени (в 2-3 раза) в менее васкуляризированных органах (сердце, мозг, мышцы, брыжейка). Метаболизм и выведение. Обладает эффектом первого прохождения через печень. В неизменном виде с мочой и калом выводится, соответственно, 0.23 % и 0.33 % от введенной дозы. Период полувыведения составляет около 11 ± 4.93 часов.

Показания

Симптоматическое лечение - хроническая идиопатическая крапивница, сезонный аллергический ринит.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 4 мг 1 раз в сутки. Препарат желательно принимать утром, в одно и тоже время. Длительность курса лечения 14 дней.

Противопоказания

• повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата • беременность и период грудного вскармливания • детский возраст до 18 лет • почечная, печеночная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Теоритин® МФ противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Практически все нежелательные явления, выявленные в ходе клинических исследований, относились к легкой степени тяжести. Не было зарегистрировано ни одного случая развития серьезного нежелательного явления, выявленные нежелательные явления были клинически незначимы и не требовали принятия каких-либо коррекционных мер. Ниже приведены нежелательные реакции, наблюдавшиеся в ходе клинических исследований, с указанием частоты их развития в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (≥1 /10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1 /10000, <1/1000) и очень редко (<1/10000), частота неизвестна (по имеющимся данным установить частоту возникновения не представлялось возможным). Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко (единичные случаи) – снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), повышение ЧСС. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: часто – сухость во рту очень редко (единичный случай) – диспепсия, боль в животе. Нарушения со стороны центральной нервной системы: часто – головная боль очень редко (единичный случай) – головокружение, слабость. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко (единичный случай) – дизурия. Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований: часто - повышение активности печеночных трансаминаз и уровня билирубина редко – билирубинурия, протеинурия очень редко - повышение pH мочи, изменение уровня гликемии (повышение или снижение). ЭКГ: нечасто – нарушение процессов реполяризации очень редко – нарушение проводимости. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усиливаются или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, обязательно сообщите об этом врачу!

Передозировка

В ходе клинических исследований при приеме 4 мг препарата в сутки в течение 14 дней случаев передозировки не описано. Лечение: в случае передозировки следует обратиться к врачу. Рекомендуется симптоматическое лечение, промывание желудка. Специфический антидот отсутствует.

Взаимодействие с другими препаратами

В ходе клинических исследований не выявлено клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами. Прием пищи не оказывает влияние на эффективность препарата Теоритин® МФ.

Особые указания

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов пожилого возраста, пациентов с закрытоугольной глаукомой и гиперплазией предстательной железы.

Срок хранения после открытия

36 месяцев

Условия хранения

В оригинальной упаковке, при температуре не выше 30 °C. Хранить в недоступном для детей месте.