Инструкция по применению
ТераФлю лар Спрей для местного применения 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Швейцария
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензоксония хлорид+Лидокаина гидрохлорид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 мг+ 1,5 мг/1 мл
Срок годности: 60.0

Описание

ТераФлю ЛАР спрей – спрей против вирусов и боли в горле, который оказывает сразу 5 действий*: • Антисептическое • Местное анестезирующее • Антибактериальное • Противовирусное • Противогрибковое Взрослым при проведении каждой процедуры проводят по 4 распыления (приблизительно 0,5 мл), кратность - 3-6 раз в сутки. Детям (начиная с 4 лет) - не более 2-3 распылений при проведении каждой процедуры, кратность – 3-6 раз в сутки*. * Антисептическое, местное анестезирующее, антибактериальное (Грам (+), Грам (-)), противогрибковое, противовирусное. Инструкция по медицинскому применению,РУ ЛС-001853 от 05.08.2011

Действующее вещество

Бензоксония хлорид+Лидокаина гидрохлорид

Состав

Активное вещество: бензоксония хлорид 0.2%, лидокаина гидрохлорид 0.15%, Вспомогательные вещества: этанол 96% (об./об.) - 10%, глицерол - 15%, хлористоводородная кислота 0.1N - 0.0581%, масло мяты перечной - 0.01%, ментол - 0.0025%, вода очищенная - до 100%.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Бензоксония хлорид практически не абсорбируется. Концентрация бензоксония хлорида практически не определяется. В тканях организма накопление активного вещества не обнаружено. Около 1% полученной дозы бензоксония хлорида обнаруживается в моче. Лидокаин абсорбируется при приеме внутрь и через слизистую оболочку ротовой полости. Метаболизируется при первом прохождении через печень. При пероральном введении биодоступность составляет около 35%. Метаболиты лидокаина выводятся вместе с мочой, менее 10% активного вещества выводится в неизмененном виде.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: фарингит, ларингит, катаральная ангина, стоматит, язвенный гингивит, хронический тонзиллит (в качестве вспомогательного средства).

Способ применения и дозы

Взрослым назначают по 4 распыления (приблизительно 0.5 мл) 3-6 раз/сут. Детям в возрасте 4 лет и старше назначают не более 2-3 распылений 3-6 раз/сут. Длительность лечения - не более 5 дней. Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 5 дней терапии, пациент должен обратиться к врачу. Спрей распыляют в ротовой полости, держа баллончик вертикально.

Противопоказания

Беременность, период лактации (грудного вскармливания), детский возраст до 4 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к аммиачным соединениям.

Применение при беременности и кормлении грудью

ТераФлю® ЛАР противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Клинический опыт применения препарата при беременности очень ограничен. Не имеется клинических данных о выделении активных веществ с грудным молоком. В экспериментальных исследованиях не обнаружено влияния препарата на репродуктивную функцию и развитие плода.

Побочные действия

Определение частоты побочных реакций: очень часто (⩾10%), часто (⩾1%, но ⩽10%), нечасто (⩾0.1%, но ⩽1%), редко (⩾0.01%, но ⩽0.1%), очень редко (⩽0.01%). Местные реакции: нечасто - раздражение, носящее временный характер. При применении препарата более 2 недель может наблюдаться обратимая коричневая окраска языка или зубов. Аллергические реакции: в единичных случаях - крапивница, отек лица, отек гортани.

Передозировка

Симптомы: при случайном приеме препарата (как и других аммониевых соединений) в высоких дозах возможны тошнота, рвота. Содержание лидокаина в препарате незначительно и не может вызвать серьезных симптомов передозировки. Лечение: рекомендуется выпить молока или съесть яичный белок, взбитый в воде.

Взаимодействие с другими препаратами

Эффективность бензоксония хлорида уменьшается при одновременном использовании анионно-активных средств, например, зубной пасты. Этанол повышает абсорбцию бензоксония хлорида.

Особые указания

Во время применения препарата ТераФлю® ЛАР следует избегать употребления алкоголя. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Не влияет.

Условия хранения

В сухом месте