Инструкция по применению
Терафлекс Хондрокрем Форте Крем 100 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелоксикам+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородный крем от светло-желтого с зеленоватым оттенком до желтого с зеленоватым оттенком цвета с запахом диметилсульфоксида.

Действующее вещество

Мелоксикам+Хондроитина сульфат

Состав

Действующие вещества: хондроитина сульфат натрия - 50 мг, мелоксикам - 10 мг, Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид -100 мг, пропиленгликоль - 100 мг, макрогола цетостеарат - 12 мг, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт не более 60 %, стеариловый спирт не менее 40 %] - 42 мг, парафин жидкий - 100 мг, вазелин - 80 мг, имидомочевина - 3 мг, натрия дисульфит - 0,5 мг, вода - до 1,00 г.

Форма выпуска

Крем

Показания

Препарат рекомендуется к применению в составе комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеоартроза, остеохондроза позвоночника, иных заболеваний суставов, сопровождающихся болевым синдромом.

Способ применения и дозы

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения - 2-3 раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. После нанесения препарата руки необходимо тщательно вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта. После 2-х недель использования препарата следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата (а также к другим нестероидным противовоспалительным средствам), нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано в период беременности и лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции со стороны кожи (зуд, покраснение, кожная сыпь). При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение крема и обратиться к врачу.

Передозировка

Крайне низкая системная абсорбция активных компонентов препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Препарат следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания препарата на глаза и слизистые оболочки.Следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением Хондроксид® Форте крема с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, а также при необходимости использования препарата более 2-х недель. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не вызывает седативного эффекта, психомоторных нарушений и не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.