Инструкция по применению
Термикон Крем 1 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тербинафин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Тербинафин

Состав

Действующее вещество: ТербинафинКонцентрация действующего вещества: 150 мг

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При местном применении абсорбция - менее 5%, оказывает незначительное системное действие.

Показания

— профилактика и лечение грибковых инфекций кожи, в т.ч. микозов стоп (tinea pedis), паховой эпидермофитии (tinea cruris), грибковых поражений гладкой кожи тела (tinea corporis), вызванных дерматофитами;— дрожжевые инфекции кожи (в основном вызываемые Candida albicans), в частности, опрелость;— разноцветный лишай (Pityriasis versicolor), вызываемый Pityrosporum orbiculare.

Способ применения и дозы

Термикон назначают наружно взрослым и детям старше 12 лет.Перед нанесением крема необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Крем наносят 1-2 раза /сут тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки, слегка втирают.При инфекциях, сопровождающихся опрелостью (под молочными железами, в межпальцевых промежутках, между ягодицами, в паховой области), места нанесения крема можно прикрывать марлей, особенно на ночь.Средняя продолжительность лечения при дерматомикозе туловища, голеней, стоп - 1 раз/сут в течение 1 недели; при кандидозе кожи - 1-2 раза/сут в течение 1-2 недель; при разноцветном лишае - 1-2 раза/сут в течение 2 недель.Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае, если через 1-2 недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза.Режим дозирования препарата для пациентов пожилого возраста такой же как для пациентов других возрастных групп.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует применять препарат при печеночной и/или почечной недостаточности, алкоголизме, угнетении костномозгового кроветворения, опухолях, болезнях обмена веществ, окклюзионных заболеваниях сосудов конечностей, у детей в возрасте до 12 лет (отсутствие достаточного клинического опыта).

Применение при беременности и кормлении грудью

До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении Термикона. Однако, поскольку клинический опыт применения Термикона при беременности очень ограничен, его следует применять только по строгим показаниям.Тербинафин выделяется с грудным молоком. В случае применения кормящей матерью Термикона через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому неблагоприятное воздействие на младенца маловероятно.В экспериментальных исследованиях тератогенных свойств тербинафина выявлено не было.

Побочные действия

Местные реакции: в местах нанесения крема возможны покраснение, ощущение зуда или жжения, аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось. Если Термикон случайно будет принят внутрь, можно ожидать развития таких же симптомов, как и при передозировке таблеток: головная боль, тошнота, боли в эпигастрии и головокружение.Лечение: активированный уголь, при необходимости - симптоматическая поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о лекарственном взаимодействии Термикона не имеется.

Особые указания

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения имеется риск рецидива инфекции.Термикон предназначен только для наружного применения.При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат.

Условия хранения

В сухом месте