Инструкция по применению
Термикон Спрей 1 % 30 г

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тербинафин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Тербинафин

Состав

на 1 баллонактивное вещество - тербинафина гидрохлорид 0,3 г вспомогательные вещества: спирт этиловый ректификованный (этанол), пропиленгликоль, проксанол 268, вода очищенная.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При местном применении абсорбция - менее 5%, оказывает незначительное системное действие.

Показания

Профилактика и лечение грибковых инфекций кожи, в том числе микозов стоп («грибок» стопы), паховой эпидермофитии (tinea cruris), грибковых поражений гладкой кожи тела (tinea corporis), вызванных такими дерматофитами, как Trichophyton (в том числе, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum. Разноцветный лишай (Pityriasis versicolor), вызываемый Pityrosporum orbiculare (также известный под названием Malassezia furfur).

Способ применения и дозы

Наружно.Взрослые. Термикон спрей можно применять 1 или 2 раза в день, в зависимости от показаний. Перед применением препарата необходимо тщательно очистить и подсушить пораженные участки. Препарат распыляют на пораженные участки в количестве, достаточном для их тщательного увлажнения, и, кроме того, наносят на прилегающие участки интактной кожи. Продолжительность лечения и кратность применения препарата: дерматомикоз туловища, голеней: 1 неделя; 1 раз в сутки дерматомикоз стоп: 1 неделя; 1 раз в сутки разноцветный лишай: 1 неделя; 2 раза в суткиРежим дозирования спрея Термикон у лиц пожилого возраста не отличается от вышеописанного.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тербинафину или к любому вспомогательному компоненту препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В экспериментальных исследованиях тератогенных свойств тербинафина выявлено не было. До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении Термикона. Однако, поскольку клинический опыт применения Термикона у беременных женщин очень ограничен, его следует применять только по строгим показаниям. Тербинафин выделяется с грудным молоком. Однако, в случае применения кормящей матерью Термикона спрея через кожу всасывается небольшое количество активного вещества, поэтому неблагоприятное воздействие на младенца маловероятно.

Побочные действия

В местах нанесения препарата может появиться покраснение, ощущение зуда или жжения. Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось. Если же случайно Термикон спрей будет принят внутрь, можно ожидать развития таких же побочных явлений, как и при передозировке таблеток Термикон (головная боль, тошнота, боли в эпигастрии и головокружение). Следует также учитывать содержание в препарате этилового спирта. Лечение: активированный уголь, при необходимости - симптоматическая поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Какие-либо лекарственные взаимодействия для спрея Термикон не известны.

Особые указания

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения имеется риск рецидива инфекции. В том случае, если через неделю лечения не отмечается признаков улучшения, следует верифицировать диагноз. Следует соблюдать осторожность при нанесении спрея Термикон на поврежденные участки кожи, так как спирт может вызвать раздражение. Термикон спрей предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом. Если препарат был случайно введен в дыхательные пути при ингаляции, то, в случае появления каких-либо симптомов и особенно при их стойком сохранении, необходимо проконсультироваться с врачом. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат.

Условия хранения

Не допускать замерзания