Инструкция по применению
Термопсол Таблетки от кашля 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 6,7 мг+ 250 мг
Срок годности: 36.0

Описание

таблетки от зеленовато-серого до зеленовато-серого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы. Допускается наличие темных вкраплений.

Действующее вещество

Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат]

Состав

Активные компоненты: Термопсиса ланцетного трава, порошок – 0,0067 г, натрия гидрокарбонат – 0,25 г Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 0,0279 г, тальк – 0,0054 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Кашель с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) — в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. Детям старше 12 лет - по таблетке 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Необходимость назначения повторного курса определяется врачом. Высшие дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая — 0,l г суточная – 0,3 г.

Противопоказания

Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Контролируемых исследований на беременных не проводилось. Нет данных о проникновении алкалоидов, содержащихся в траве термопсиса, через плацентарный барьер и в грудное молоко. Не применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Тошнота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота. Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут снижать всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса. Термопсол® таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение мокроты.

Особые указания

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье

Условия хранения

В сухом месте