Инструкция по применению
Терпинкод Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кодеин + Терпингидрат
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 48

Описание

Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской. Допускается незначительная мраморность.

Действующее вещество

Кодеин + Терпингидрат

Состав

Состав на одну таблетку: _действующие вещества:_ кодеин - 8,0 мг, терпингидрат - 250,0 мг, натрия гидрокарбонат - 250,0 мг; _вспомогательные вещества:_ крахмал картофельный - 71,1 мг, кислота стеариновая - 5,9 мг, тальк - 15 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

"Сухой" кашель различной этиологии при заболеваниях легких и дыхательных путей (в т.ч. бронхопневмония, бронхит, эмфизема легких) у взрослых и детей старше 12 лет.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день. Максимальная продолжительность лечения без консультации врача - 5 сут.

Противопоказания

* Гиперчувствительность к компонентам препарата; * Дыхательная недостаточность; * Бронхиальная астма; * Одновременный прием этанола или наркотических анальгетиков; * Детский возраст младше 12 лет; * Детский и подростковый возраст от 12 до 18 лет при наличии патологии органов дыхания (например, бронхиальной астмы и других хронических заболеваний дыхательных путей); * Беременность и период грудного вскармливания; * Высокая активность ферментов цитохрома Р450 (CYP2D6).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Терпинкод® противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожный зуд, крапивница). Тошнота, рвота, запоры, головная боль, сонливость. При длительном бесконтрольном применении возможно развитие зависимости к кодеину.

Передозировка

Симптомы: рвота, сонливость, атония мочевого пузыря, ухудшение координации движений глазных яблок с нарушением зрения, брадипноэ, угнетение дыхательного центра, аритмии, брадикардия. Лечение: промывание желудка с активированным углем и калия перманганатом, введение дыхательных аналептиков, атропина и конкурентного физиологического антагониста кодеина - налоксона.

Взаимодействие с другими препаратами

Хлорамфеникол тормозит метаболизм кодеина в печени и тем самым усиливает его действие. При одновременном применении лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, возможно усиление седативного эффекта и угнетающего действия на дыхательный центр. Кодеин усиливает действие этанола на психомоторные функции. При применении кодеина в больших дозах действие сердечных гликозидов (дигоксин и др.) может усиливаться, т.к. в связи с ослаблением перистальтики усиливается их всасывание. Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание кодеина.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.