Инструкция по применению
Тержинан Таблетки вагинальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Софартекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Неомицин+Нистатин+Преднизолон+Тернидазол
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36



Действующее вещество

Неомицин+Нистатин+Преднизолон+Тернидазол

Состав

Действующее вещество: Тернидазол, Нистатин, Неомицина сульфат, Преднизолона метасульфобензоат натрияКонцентрация действующего вещества (мг): Тернидазол - 200 мг, Неомицина сульфат - 100 мг, Преднизолона метасульфобензоат натрия - 3 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Тержинан не предоставлены.

Показания

Бактериальный вагинит; трихомониаз влагалища; вагинит, вызванный грибами рода Candida; смешанный вагинит. Профилактика урогенитальных инфекций/вагинитов, в т. ч.: перед гинекологическими операциями; перед родами или абортом; до и после установки ВМС; до и после диатермокоагуляции шейки матки; перед гистерографией.

Способ применения и дозы

Для вагинального введения.1 таблетку вводят глубоко во влагалище в положении лежа перед сном. Перед введением таблетку следует подержать в воде в течение 20-30 сек. После введения необходимо лежать в течение 10-15 мин.Средняя продолжительность лечебного курса - 10 дней; в случае подтвержденного микоза продолжительность лечения может быть увеличена до 20 дней; средняя продолжительность профилактического курса - 6 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Тержинана со II триместра беременности.Применение Тержинана в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Побочные действия

Чувство жжения, зуд и раздражение во влагалище. Аллергические реакции.

Передозировка

Нет данных о случаях передозировки.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Тержинан не выявлено.

Особые указания

Не следует прекращать лечение во время менструации.

Условия хранения

Беречь от детей