Инструкция по применению
Тержинан Таблетки вагинальные 6 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Софартекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Неомицин+Нистатин+Преднизолон+Тернидазол
Количество в упаковке: 6
Срок годности: 36



Действующее вещество

Неомицин+Нистатин+Преднизолон+Тернидазол

Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: тернидазол 200 мг, неомицина сульфат 100 мг (65 000 МЕ), нистатин 100 000 МЕ, преднизолона метасульфобензоат натрия 4.7 мг, что соответствует содержанию преднизолона 3 мг.Вспомогательные вещества: крахмал пшеничный - 264 мг, лактозы моногидрат - q.s. до 1.2 г, кремния диоксид коллоидный - 6 мг, магния стеарат - 10 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 48 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Тержинан не предоставлены.

Показания

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в т. ч.:— бактериальный вагинит;— трихомониаз влагалища;— вагинит, вызванный грибами рода Candida;— смешанный вагинит.Профилактика урогенитальных инфекций /вагинитов, в т.ч.:— перед гинекологическими операциями;— перед родами или абортом;— до и после установки ВМС;— до и после диатермокоагуляции шейки матки; — перед гистерографией.

Способ применения и дозы

Для вагинального введения.1 таблетку вводят глубоко во влагалище в положении лежа перед сном. Перед введением таблетку следует подержать в воде в течение 20-30 сек. После введения необходимо лежать в течение 10-15 мин.Средняя продолжительность лечебного курса - 10 дней; в случае подтвержденного микоза продолжительность лечения может быть увеличена до 20 дней; средняя продолжительность профилактического курса - 6 дней.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Тержинана со II триместра беременности.Применение Тержинана в I триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Побочные действия

Местные реакции: редко - чувство жжения, зуд и раздражение во влагалище (особенно в начале терапии).Прочие: в отдельных случаях - аллергические реакции.

Передозировка

Нет данных о случаях передозировки.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Тержинан не выявлено.

Особые указания

В случае лечения вагинитов, трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.Не следует прекращать лечение во время менструации.

Условия хранения

Беречь от детей