Инструкция по применению
Тестис Композитум Раствор Ампулы 2,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии для стимуляции функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Testis suis (тестис суис) D4 22 мкл, Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D8 22 мкл, Glandula suprarenalis suis (гландула супрареналис суис) D13 22 мкл, Kalium picrinicum (калиум пикриникум) D6 22 мкл, Ginseng (гинсенг) D4 22 мкл, Damiana (дамиана) D8 22 мкл, Caladium seguinum (каладиум сегуинум) D6 22 мкл, Cor suis (кор суис) D8 22 мкл, Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D13 22 мкл, Vitex agnus-castus (витекс агнус-кастус) D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 мкл, Strychninum phosphoricum (стрихнинум фосфорикум) D6 22 мкл, Cantharis (кантарис) D8 22 мкл, Curare (кураре) D8 22 мкл, Conium maculatum (кониум макулатум) D28 22 мкл, Lycopodium clavatum (ликоподиум клаватум) D28 22 мкл, Phosphorus (фосфорус) D8 22 мкл, Diencephalon suis (диенцефалон суис) D10 22 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22 мкл, Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D10 22 мкл, Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8 22 мкл, Zincum metallicum (цинкум металликум) D10 22 мкл, Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6 22 мкл, Вспомогательные вещества: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.

Способ применения и дозы

По 1 ампуле подкожно, внутримышечно 1-3 раза в неделю. Длительность курса определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте