Инструкция по применению
Тиберал Таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Турция
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Орнидазол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 60



Действующее вещество

Орнидазол

Состав

Действующее вещество: Орнидазол (ornidazole)Концентрация действующего вещества (мг): 500

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь абсорбция из ЖКТ высокая. Время достижения Cmax составляет 1-2 ч.Связывание с белками плазмы составляет 15% или более. Проникает через ГЭБ. T1/2 - около 13 ч.Выводится в виде метаболитов почками (60-70%) и с калом (20-25%), в неизмененном виде - около 5%.

Показания

Трихомониаз, амебиаз (кишечные и некишечные формы, включая амебную дизентерию и амебный абсцесс печени), лямблиоз, профилактика послеоперационных осложнений (особенно при операциях на ободочной кишке или в гинекологии).

Способ применения и дозы

Тиберал всегда принимают после еды.Трихомониаз:По 1 таблетке 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5 дней.Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер во всех случаях должен получить такой же курс лечения. Суточная доза для детей составляет 25 мг/кг массы тела и назначается в один прием.

Противопоказания

Гиперчувствительность к препарату или другим производным нитроимидазола.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан в I триместре беременности, в период лактации. При беременности применение возможно только по абсолютным показаниям, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Побочные действия

Слабо выраженные сонливость, головные боли и желудочно-кишечные расстройства (тошнота). В отдельных случаях - нарушения со стороны ЦНС, такие, как головокружение, тремор, ригидность, нарушение координации, судороги, усталость, временная потеря сознания, признаки сенсорной или смешанной периферической нейропатии. Наблюдались случаи извращения вкусовых ощущений, изменения печеночных функциональных проб, кожных реакций и реакций гиперчувствительности.

Взаимодействие с другими препаратами

Потенцирует действие непрямых антикоагулянтов, увеличивает продолжительность действия векурония бромида.

Особые указания

Не ингибирует алкогольдегидрогеназу, поэтому не является несовместимым с алкоголем.

Условия хранения

Беречь от детей