Инструкция по применению
Тикагрелор Таблетки 90 мг 56 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тикагрелор
Количество в упаковке: 56



Описание

Препарат представляет собой круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до светло-желтого с коричневатым оттенком цвета.

Действующее вещество

Тикагрелор

Состав

Препарат Тикагрелор содержит: Действующим веществом является тикагрелор. Каждая таблетка содержит 90 мг тикагрелора. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция гидрофосфата дигидрат, гипромеллоза, карбоксиметилкрахмал натрия тип А, магния стеарат. Пленочная оболочка содержит: гипромеллоза, титана диоксид (Е171), тальк, макрогол-4000, краситель железа оксид желтый (Е172).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Тикагрелор, при совместном приеме с ацетилсалициловой кислотой, показан к применению у взрослых. Профилактика атеротромботических осложнений у взрослых пациентов с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда без подъема сегмента ST или инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI)), включая пациентов, получавших лекарственную терапию, и пациентов, подвергнутых ЧКВ или аортокоронарному шунтированию (АКШ).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Пациенты, принимающие препарат Тикагрелор, должны ежедневно получать, если отсутствуют специфические противопоказания, низкую поддерживающую дозу АСК (75-150 мг в сутки).Применение препарата Тикагрелор следует начинать с приема однократной нагрузочной дозы 180 мг (2 таблетки по 90 мг) и затем продолжать прием по 90 мг 2 раза в сутки. Пациентам с ОКС нагрузочную дозу препарата Тикагрелор 180 мг следует назначить как можно скорее независимо от любой предшествовавшей антиагрегантной терапии.Путь и (или) способ примененияВнутрь. Препарат Тикагрелор можно принимать вне зависимости от времени приёма пищи. Если Вам трудно проглотить таблетку, Вы можете растолочь ее и смешать с водой следующим образом: таблетку следует измельчить до состояния мелкого порошка, размешать в половине стакана питьевой воды и сразу же выпить полученную суспензию. Остатки смешать с дополнительной половиной стакана питьевой воды и выпить полученную суспензию.Если Вы находитесь в больнице, Вам могут ввести измельченную таблетку, смешанную с небольшим количеством воды через назогастральный зонд.Продолжительность терапииРекомендуется длительная терапия препаратом Тикагрелор, кроме случаев клинической необходимости в досрочной отмене препарата. Пациенты, начавшие прием препарата Тикагрелор 90 мг 2 раза в сутки в период лечения острого коронарного синдрома, через 1 год могут продолжить терапию препаратом Тикагрелор 60 мг 2 раза в сутки без перерывов.Если Вы забыли принять препарат ТикагрелорЕсли Вы забыли принять препарат Тикагрелор, примите его, как только вспомните. Затем примите следующую дозу в обычное время. Если уже почти пришло время для следующей дозы, не принимайте дозу, которую Вы пропустили.Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.Если Вы прекратили прием препарата ТикагрелорПреждевременная отмена любой антиагрегантной терапии, включая препарат Тикагрелор, может повысить риск сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда или инсульта в результате основного заболевания. Необходимо избегать преждевременного прекращения приема препарата. Принимайте данный препарат регулярно и до тех пор, пока его прописывает врач. Не прекращайте прием препарата, предварительно не посоветовавшись с лечащим врачом.При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Тикагрелор, если: у Вас аллергия на тикагрелор или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, у Вас имеется патологическое кровотечение на момент начала приема препарата Тикагрелор, у Вас внутричерепное кровоизлияние в анамнезе, у Вас нарушение функции печени тяжелой степени, Вы принимаете какие-либо из следующих лекарственных средств: кетоконазол (препарат для лечения грибковых инфекций), кларитромицин (препарат для лечения бактериальных инфекций), нефазодон (препарат для лечения депрессий), ритонавир и атазанавир (препарат для лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа). Вы беременны или кормите грудью. Не принимайте препарат Тикагрелор, если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам. Если Вы не уверены, поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Применение препарата Тикагрелор во время беременности противопоказано. Лактация Применение препарата Тикагрелор в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Если Вы заметили любую из перечисленных ниже серьезных нежелательных реакций - прекратите прием препарата Тикагрелор и немедленно обратитесь к врачу, Вам может потребоваться медицинская помощь: Очень часто - могут возникать у более чем 1 человека из 10: Кровотечение, связанное с заболеваниями крови, Часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10: Кровотечение из органов дыхательной системы, Желудочно-кишечное кровотечение, Подкожное или кожное кровотечение (геморрагия), Кровотечение из мочевыводящих путей, Кровотечение после проведения манипуляций, Травматические кровотечения. Нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100: Реакции гиперчувствительности, включая отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отёк). Кровотечение из опухоли, Внутричерепное кровоизлияние, Кровоизлияние в глаз, Кровоизлияние в ухо, Кровотечение в забрюшинное пространство (ретроперитонеальное кровотечение), Кровоизлияние в мышцы, Кровотечение из половых органов. Частота неизвестна - не может быть оценена на основании

имеющихся данных: Проблемы со свертываемостью крови (тромботическая тромбоцитопеническая пурпура), такие как лихорадка и пурпурные пятна на коже или во рту, с пожелтением кожи или глаз (желтуха) или без него, необъяснимая сильная усталость или спутанность сознания, Нарушение дыхания, вплоть до остановки, чаще во сне (центральное апноэ сна, включая дыхание Чейна-Стокса). Другие нежелательные реакции: Очень часто - могут возникать у более чем 1 человека из 10: Повышенное содержание мочевой кислоты в крови (гиперурикемия), Одышка. Часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10: Отложение кристаллов мочевой кислоты в различных органах и тканях (подагра), воспаление суставов на фоне отложения кристаллов мочевой кислоты (подагрический артрит), Головокружение, Обморок, Головная боль, Головокружение, вызванное заболеванием уха (вертиго), Снижение давления (артериальная гипотензия), Диарея, Тошнота, Чувство тяжести, нарушение пищеварения, болезненные ощущения в верхней части живота (диспепсия), Запор, Кожный зуд, Кожная сыпь, Повышение концентрации креатинина в крови. Нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100: Спутанность сознания. Частота неизвестна - не может быть оценена на основании имеющихся данных: Замедленное сердцебиение (брадиаритмия), Нарушение проводимости сердца (атриовентрикулярная блокада). Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас при применении препарата Тикагрелор возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о возникновении нежелательных реакций напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Тикагрелор больше, чем следовало Если Вы приняли препарата Тикагрелор больше, чем предусмотрено, у Вас могут развиться такие нежелательные реакции как одышка и желудочковые паузы. Немедленно сообщите об этом своему врачу. Возможно, Вам потребуется медицинская помощь. В случае развития кровотечения может потребоваться хирургическое вмешательство, переливание крови или другие методы лечения. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. Если Вы забыли принять препарат Тикагрелор Если Вы забыли принять препарат Тикагрелор, примите его, как только вспомните. Затем примите следующую дозу в обычное время. Если уже почти пришло время для следующей дозы, не принимайте дозу, которую Вы пропустили. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы прекратили прием препарата Тикагрелор Преждевременная отмена любой антиагрегантной терапии, включая препарат Тикагрелор, может повысить риск сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда или инсульта в результате основного заболевания. Необходимо избегать преждевременного прекращения приема препарата. Принимайте данный препарат регулярно и до тех пор, пока его прописывает врач. Не прекращайте прием препарата, предварительно не посоветовавшись с лечащим врачом. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Сообщите своему врачу, если Вы принимаете такие препараты как: кетоконазол (используется для лечения грибковых инфекций), кларитромицин, рифампицин (используется для лечения бактериальных инфекций), нефазодон (антидепрессант), ритонавир и атазанавир (используются для лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа), фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал (используются для контроля судорог), циклоспорин (иммунодепрессант), верапамил, хинидин, дилтиазем (используются для лечения нарушений сердечного ритма), морфин и другие опиоиды (используются для снятия сильной боли), более 40 мг в день симвастатина, либо ловастатина (лекарства, используемые для лечения высокого уровня холестерина), цизаприд (используется при нарушениях пищеварения), алкалоиды спорыньи (используются для лечения мигрени), дигоксин (используется для лечения сердечной недостаточности), пароксетин, сертралин и циталопрам (антидепрессанты). Если Вы принимаете препарат Тикагрелор и гепарин, врач может рекомендовать Вам сдать образец крови для диагностических исследований в случае подозрения на редкое нарушение функции тромбоцитов, вызванное гепарином. Важно сообщить врачу, что принимаете как препарат Тикагрелор, так и гепарин, поскольку препарат Тикагрелор может повлиять на результат диагностического исследования.

Особые указания

Препарат Тикагрелор содержит натрий Данный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на одну таблетку, то есть по сути не содержит натрия. Учитывая вероятность развития побочных эффектов со стороны психики и нервной системы, таких как головокружение и спутанность сознания, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °С.