Инструкция по применению
Тилаксин Таблетки 125 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тилорон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 125 мг

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые. На поперечном разрезе таблетки оранжевого цвета.

Действующее вещество

Тилорон

Состав

На одну таблетку Действующее вещество: тилорон (тилаксин®) - 125,000 мг. Вспомогательные вещества: магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной) - 49,000 мг, тальк - 4,000 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский) - 20,000 мг, кальция стеарат - 2,000 мг. Состав оболочки: сахароза (сахар) - 108,634 мг, магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной) - 72,974 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский) - 4,441 мг, тальк - 0,741 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 1,266 мг, титана диоксид (титана двуокись пигментная) - 1,266 мг, тропеолин О - 0,028 мг, парафин жидкий (вазелиновое масло) - 0,004 мг, желатин медицинский - 0,637 мг, воск пчелиный - 0,009 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание. После приема внутрь Тилаксин® быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность составляет 60%. Распределение. Связывание с белками плазмы крови - около 80%. Метаболизм и выведение. Препарат не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме. Выводится практически в неизмененном виде через кишечник (70%) и мочой (9%). Период полувыведения (T1/2) составляет 48 часов.

Показания

Лечение гриппа и других ОРВИ, лечение герпетической инфекции. Профилактика гриппа и других ОРВИ.

Способ применения и дозы

Тилорон применяют внутрь после еды. Для лечения гриппа и других ОРВИ - по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения затем по 125 мг через 48 часов. На курс - 750 мг. Для профилактики гриппа и других ОРВИ - по 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель. На курс - 750 мг. Для лечения герпетической инфекции - первые двое суток по 125 мг затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза 125 г-25 г. При лечении гриппа и других ОРВИ в случае сохранения симптомов заболевания более 4-х дней следует проконсультироваться у врача.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к тилорону и другим компонентам препарата, - беременность и период грудного вскармливания, - детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Нежелательные реакции (НР) сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: возможны диспепсические явления. Нарушения со стороны иммунной системы: возможны аллергические реакции кратковременный озноб.

Передозировка

Случаи передозировки препарата неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний. Клинически значимого взаимодействия тилорона с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний не выявлено.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 5 до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.