Инструкция по применению
Тилорам Таблетки покрытые пленочной оболочкой 125 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тилорон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 125 мг
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Тилорон

Состав

Тилорон (в форме дигидрохлорида) 125 мг;Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 101 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 45 мг, кроскармеллоза натрия - 9 мг, вода - 5 мг, повидон К17 - 12 мг, магния стеарат - 3 мг.; Состав оболочки: гипромеллоза - 5.7 мг, макрогол 4000 - 1.4 мг, титана диоксид - 2.8 мг, краситель тропеолин О - 0.1 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Лечение и профилактика гриппа, других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ); лечение вирусных гепатитов А, В и С; лечение герпетической и цитомегаловирусной инфекции; в составе комплексной терапии инфекционно-аллергических и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и др.); в составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза; в комплексной терапии туберкулеза легких.

Способ применения и дозы

Тилорон принимают внутрь, после еды. ; Для лечения вирусного гепатита А - в первые сутки по 125 мг 2 раза, затем по 125 мг через 48ч. На курс - 1,25г. Для лечения острого гепатита В - первые два дня по 125 мг, затем 125 мг через 48 часов, на курс лечения - 2г. При затяжном течении гепатита В - по 125 мг 2 раза в сутки в первый день, затем по 125 мг через 48 часов. На курс лечения - 2,5 г. ;При хроническом гепатите В - начальная фаза лечения (2,5 г) - первые два дня по 125 мг 2 раза в день, затем 125 мг через 48 часов. Фаза продолжения (от 1,25 г до 2,5 г), по 125 мг в неделю. Курсовая доза тилорона от 3,75 г до 5 г, длительность терапии 3,5-6 месяцев в зависимости от результатов биохимических, иммунологических, морфологических исследований, отражающих степень активности процесса.

Противопоказания

• повышенная чувствительность к тилорону и другим компонентам препарата ;• период беременности и лактации ;• детский возраст до 18 лет ;• наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция

Применение при беременности и кормлении грудью

Тилорон противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: кратковременный озноб, аллергические реакции.;В отдельных случаях: диспептические симптомы.

Взаимодействие с другими препаратами

Тилорон совместим с антибиотиками, средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний.

Особые указания

Не рекомендуется применять тилорон в дозах, превышающих рекомендуемые, во избежание возможного кратковременного истощения иммунокомпетентных клеток.;В составе комплексной терапии нейровирусных инфекций тилорон применяют под наблюдением врача.

Условия хранения

В сухом месте