# Инструкция по применению
# Тилорон-Озон Таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 мг 10 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тилорон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 60 мг

## Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от желтого до оранжевого цвета. На поперечном разрезе таблетки видны: пленочная оболочка и ядро оранжевого цвета, допускаются вкрапления белого или оранжевого цвета разных оттенков.

## Действующее вещество

Тилорон

## Состав

Состав на 1 таблетку 60 мг: Активное вещество: тилорона дигидрохлорид (тилорон) - 60,00 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 84,40 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 28,50 мг, кроскармеллоза натрия - 7,60 мг, повидон-К25 - 7,60 мг, магния стеарат - 1,90 мг. Состав оболочки: гипромеллоза - 3,42 мг, макрогол-4000 - 0,84 мг, титана диоксид - 1,68 мг, краситель тропеолин-0 - 0,06 мг.

## Форма выпуска

Таблетки

**Фармакокинетика**

После приема внутрь быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность - 60%. Около 80% препарата связывается с белками плазмы. Выводится препарат практически в неизмененном виде через кишечник (70%) и через почки (9%). Период полувыведения - 48 ч. Препарат не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме.

**Показания**

У взрослых лечение и профилактика гриппа других ОРВИ, лечение вирусных гепатитов А В и С, лечение герпетической и цитомегаловирусной инфекции, в составе комплексной терапии инфекционно-аллергических и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз лейкоэнцефалит увеоэнцефалит и др.), в составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза, в комплексной терапии туберкулёза легких. У детей старше 7 лет - для лечения гриппа и других ОРВИ.

**Способ применения и дозы**

Тилорон принимают внутрь после еды. Взрослые Для лечения вирусного гепатита А - в первые сутки по 125 мг 2 раза затем по 125 мг через 48 ч. На курс - 125 г. Для лечения острого гепатита В - первые два дня по 125 мг затем 125 мг через 48 часов на курс лечения - 2 г. При затяжном течении гепатита В - по 125 мг 2 раза в сутки в первый день затем по 125 мг через 48 часов. На курс лечения - 25 г. При хроническом гепатите В - начальная фаза лечения (25 г) - первые два дня по 125 мг 2 раза в день затем 125 мг через 48 часов. Фаза продолжения (от 125 г до 25 г) по 125 мг в неделю. Курсовая доза тилорона от 375 г до 5 г длительность терапии 35-6 месяцев в зависимости от результатов биохимических иммунологических морфологических исследований отражающих степень активности процесса. При остром гепатите С - по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения затем по 125 мг через 48 часов. Курс лечения - 25 г. При хроническом гепатите С - начальная фаза лечения (25 г) - первые два дня по 125 мг 2 раза в день затем 125 мг через 48 часов. Фаза продолжения (25 г) по 125 мг в неделю. Курсовая доза тилорона - 5 г длительность терапии - 6 месяцев в зависимости от результатов биохимических иммунологических морфологических маркеров активности процесса. При комплексной терапии инфекционно-аллергических и вирусных энцефаломиелитов - по 125-250 мг в сутки первые 2 дня лечения затем по 125 мг через 48 часов. Дозу устанавливают индивидуально курс лечения 3-4 недели. Для лечения гриппа и других ОРВИ - по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения затем по 125 мг через 48 часов. На курс - 750 мг. Для профилактики гриппа и других ОРВИ - по 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель. На курс - 750 мг. Для лечения герпетической цитомегаловирусной инфекции - первые двое суток по 125 мг затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза - 125 - 25 г. При урогенитальном и респираторном хламидиозе - первые двое суток по 125 мг затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза -125 г. При комплексной терапии туберкулёза легких - по 250 мг первые двое суток лечения далее по 125 мг через 48 часов. Курсовая доза - 25 г. Дети старше 7 лет У детей старше 7 лет при неосложненных формах гриппа и других ОРВИ - по 60 мг 1 раз в день на 1-й 2-й и 4-й день от начала лечения. Курсовая доза - 180 мг. При возникновении осложнений гриппа или других ОРВИ - по 60 мг 1 раз в день на 1-й 2-й 4-й и 6-й день от начала лечения. Курсовая доза - 024 г.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к тилорону и другим компонентам препарата, - период беременности и лактации, - детский возраст до 7 лет, - наследственная непереносимость лактозы дефицит лактазы глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат противопоказан в период беременности. При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции диспепсические явления кратковременный озноб.

**Передозировка**

Случаи передозировки препарата не известны.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний. Клинически значимого взаимодействия тилорона с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний не выявлено.

**Особые указания**

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.