Инструкция по применению
Тилорон-Алиум Таблетки 125 мг 6 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Алиум
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тилорон
Количество в упаковке: 1



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой оранжевого цвета. На поперечном разрезе ядро оранжевого цвета с более светлыми вкраплениями.

Действующее вещество

Тилорон

Состав

действующее вещество: тилорон - 125 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил) гидрофобный, натрия кроскармеллоза (примеллоза), магния стеарат, вспомогательные вещества для оболочки: готовая смесь для пленочной оболочки [гипромеллоза, тальк, титана диоксид, гипролоза, макрогол 3350, краситель солнечный закат желтый, краситель хинолиновый желтый].

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Абсорбция. После приема препарата внутрь быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность - 60 %. Распределение. Около 80 % препарата связывается с белками плазмы. Метаболизм и элиминация. Препарат не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме. Выводится практически в неизменном виде через кишечник (около 70 %) и через почки с мочой (около 9 %). Период полувыведения лекарственного препарата (T½) составляет 48 ч.

Показания

В составе комплексной терапии у взрослых: лечение гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), лечение герпетической инфекции. Профилактика гриппа и других ОРВИ у взрослых.

Способ применения и дозы

ТИЛОРОН-АЛИУМ принимают внутрь, после еды. Для взрослых: Для лечения гриппа и других ОРВИ- по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения, затем по 125 мг через 48 часов. На курс- 750 мг (6 таблеток). Для профилактики гриппа и других ОРВИ- по 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель. На курс- 750 мг (6 таблеток). Для лечения герпетической инфекции- первые двое суток по 125 мг, затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза- 1,25-2,5 г (10-20 таблеток). При лечении гриппа и других ОРВИ в случае сохранения симптомов заболевания более 4 дней следует проконсультироваться у врача. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тилорону или любому другому компоненту препарата. Беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет. Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диспепсические явления, кратковременный озноб. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки препарата неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместим с антибиотиками, лекарственными средствами для лечения вирусных и бактериальных заболеваний. Клинически значимого взаимодействия тилорона с антибиотиками и средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний не выявлено.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятиям другими потенциально опасными видами деятельности, требующим повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.