Инструкция по применению
Тимоген 0,01% Раствор для внутримышечного введения 1 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: ДЕКО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Альфа-глутамил-триптофан
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 0,01%

Описание

Бесцветный прозрачный раствор без запаха.

Действующее вещество

Альфа-глутамил-триптофан

Состав

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу. Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша. Препарат Тимоген содержит Действующим веществом является альфа-глутамил-триптофан. В каждой ампуле (1 мл) содержится 100 мкг альфа-глутамил-триптофана (в виде альфа-глутамил-триптофана натрия). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия хлорид, вода для инъекций.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Препарат Тимоген показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет для комплексной терапии острых и хронических вирусных и бактериальных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета: вирусные гепатиты, острые и хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ): хронический бронхит, острая и хроническая пневмония, гнойно-воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей: пиодермии, фурункулёз, рожистое воспаление, тяжелые диффузные формы атопического дерматита, тяжелые механические, химические, радиационные и термические травмы (ожоговая болезнь), раневые и хирургические инфекции, в том числе гнойно-септические осложнения в послеоперационном периоде, в период предоперационной подготовки при плановых хирургических операциях с целью профилактики инфекционных осложнений и стимулирования процессов регенерации, после лучевой терапии, химиотерапии, а также длительной антибактериальной терапии в больших дозах. Препарат Тимоген показан к применению у взрослых для комплексной терапии острых и хронических вирусных и бактериальных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета: гнойно-воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей: карбункул, поверхностные абсцессы, флегмоны, гнойные нелактационные маститы, в том числе сопровождающиеся синдромом общей инфекционной интоксикации. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Взрослым: 100 мкг 1 раз в сутки. Применение у детей и подростков Детям: от 6 месяцев до 1 года - 10 мкг в сутки. от 1 года до 3 лет включительно - 10-20 мкг в сутки. от 4 до 6 лет включительно - 20-30 мкг в сутки. от 7 до 14 лет - 50 мкг в сутки. от 14 лет по 100 мкг в сутки. Путь и (или) способ введения Внутримышечно 1 раз в сутки. Продолжительность терапии Длительность курса лечения для взрослых и детей - от 3 до 10 дней. Длительность курса лечения для взрослых при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей - 7 дней. Проведение повторного курса возможно не ранее, чем через 1 месяц. В течение года возможно проведение 4-х курсов.

Противопоказания

Не принимайте препарат Тимоген, если у Вас аллергия на альфа-глутамил-триптофан или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Возможность применения препарата Тимоген в период беременности и грудного вскармливания определяется лечащим врачом.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Тимоген может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При применении препарата Тимоген возможны аллергические реакции.

Передозировка

Если вы забыли применить препарат Тимоген Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу. Если вы применили препарата Тимоген больше, чем следовало Симптомы передозировки не описаны. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Особые указания

Перед применением препарата Тимоген проконсультируйтесь с лечащим врачом. Особенностей применения препарата детьми и взрослыми, имеющими хронические заболевания, нет. Дети Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 6 месяцев вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (безопасность и эффективность применения препарата Тимоген у детей в возрасте до 6 месяцев не установлены). Не применяйте препарат у детей и подростков до 18 лет по показанию гнойно-воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей: карбункул, поверхностные абсцессы, флегмоны, гнойные нелактационные маститы, в том числе сопровождающиеся синдромом общей инфекционной интоксикации. Препарат Тимоген содержит натрий Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 мл, то есть по сути не содержит натрия.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат Тимоген не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на ампуле и картонной пачке после "Годен до". Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Хранить при температуре от 0 °С до 10 °С.