Инструкция по применению
Тимоген спрей назальный 0,025% 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Цитомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Альфа-глутамил-триптофан
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 25 мкг/доза
Срок годности: 30

Действующее вещество

Альфа-глутамил-триптофан

Состав

1 доза спрея содержит:Активное вещество: альфа-глутамил-триптофан натрия (в пересчете на альфа-глутамил-триптофан) 25 мкг.Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 900 мг, бензалкония хлорид - 10 мг, вода очищенная - до 0.1 мл.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Препарат быстро поступает в системный кровоток после его интраназального введения. Альфа-глутамил-триптофан натрия под воздействием пептидаз расщепляется на L-глутаминовую кислоту и L-триптофан, которые используются организмом в пептидном синтезе.

Показания

— комплексная терапия острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, сопровождающихся снижением показателей клеточного иммунитета;— профилактика угнетения иммунитета, кроветворения, процессов регенерации в посттравматическом и послеоперационном периоде, в процессе проведения лучевой терапии или химиотерапии, при использовании массивных доз антибиотиков;— профилактика и комплексная терапия вирусных (в т.ч. ОРЗ и грипп), бактериальных и хламидийных инфекций;— профилактика и комплексная терапия острых и хронических заболеваний дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Раствор для в/м введения применяют в/м и интраназально. Рекомендуемые дозы для в/м и интраназального введения составляют:Пациенты Тимогенмкг каплиДети до 1 года 10 2-3Дети от 1 года до 3 лет 10-20 3-5Дети от 4 до 6 лет 20-30 5-7Дети от 7 до 14 лет 50 8-10Взрослые 50-100 10-20Продолжительность терапии 3-10 дней в зависимости от выраженности нарушений иммунитета.С профилактической целью препарат назначают интраназально или в/м ежедневно взрослым по 100 мкг, детям – по 50-75 мкг в течение 3-5 дней.Спрей назальный дозированный назначают взрослым по 1 дозе (25 мкг) в каждую ноздрю 2 раза/сут; детям в возрасте от 7 до 14 лет - по 1 дозе (25 мкг) в каждую ноздрю 1 раз/сут; детям в возрасте от 1 года до 6 лет - по 1 дозе (25 мкг) в одну ноздрю 1 раз/сут. Препарат назначают в течение 10 дней с лечебной целью и в течение 3-5 дней - с профилактической целью.При введении спрея форсунку флакона с дозирующим устройством вставляют в ноздрю в положении вертикально вверх и нажимают однократно.При необходимости возможно проведение повторного курса через 1-6 мес.

Противопоказания

— беременность;— период лактации (грудное вскармливание);— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с недостаточными клиническими данными, прием препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможен только по назначению врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: при передозировке возникает обильное выделение секрета слизистой оболочки носа, прекращающееся после отмены препарата.Лечение не требуется. При случайном приеме препарата внутрь необходимо промыть желудок водой и немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Повышает эффективность химиотерапевтических лекарственных препаратов (цитостатические, антибактериальные лекарственные препараты) и лучевой терапии. Не рекомендуется применять одновременно с ГКС в высоких дозах: иммунодепрессивный эффект указанных препаратов в высоких дозах нивелирует иммуностимулирующее действие альфа-глутамил-триптофана.

Особые указания

Препарат не имеет особенностей действия при первом приеме и при его отмене. Особенностей применения лекарственного препарата у детей и взрослых с хроническими заболеваниями нет.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не оказывает негативного влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте