Инструкция по применению
Тиотриазолин 0,1 N50 табл

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Украина
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 0,1 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат

Состав

Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат (тиотриазолин) 100 мг;Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, повидон низкомолекулярный, сахароза, целлюлоза микрокристаллическая, кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Биологическая доступность препарата - 64.5% не зависит от приема пищи, период полуабсорбции - 0.28 ч, T1/2 - 1.3 ч, Cmax в плазме крови 109 мкг/мл, TCmax - 1.18 ч, связывание с белкми крови не превышает 10%. В значительных концентрациях препарат накапливается в тканях сердца, печени, селезенки, прямой кишки и почек в незначительном количестве - в легких и тонкой кишке. Тиотриазолин ; выделяется, главным образом, почками.

Показания

— токсические поражения печени, в т.ч. алкогольного, вирусного и лекарственного происхождения (прием антибиотиков, противоопухолевых, противотуберкулезных, противовирусных препаратов, трициклических антидепрессантов, пероральных контрацептивов); — хронический алкогольный гепатит минимальной и умеренной активности; — хронический вирусный гепатит; — жировая дистрофия печени; — цирроз печени.

Способ применения и дозы

Внутрь. Тиатризолин; назначают по 1 - 2 таблетки 3-4 раза/сут на протяжении 20-30 дней.;Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от тяжести и особенности течения заболевания.

Противопоказания

— почечная недостаточность; — детский возраст; — беременность; — период лактации; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Тиотриазолин;, как правило, хорошо переносится. При клиническом применении Тиотриазолина крайне редко возможно развитие следующих побочных реакций: Со стороны пищеварительной системы: тошнота, сухость во рту, вздутие живота.;Со стороны ЦНС: общая слабость, головокружение, шум в ушах.;Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, повышение АД, боль в области сердца, аритмии.;Со стороны дыхательной системы: очень редко - одышка, приступы удушья.; Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, лихорадка; очень редко - отек Квинке.;Дерматологические реакции: зуд, гиперемия кожи, крапивница.;Местные реакции: редко - чувство покалывания и покраснение в месте введения.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При приеме внутрь большого количества препарата - необходимо сделать промывание желудка. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Тиотриазолин в качестве кардиопротекторного средства можно комбинировать с базисными средствами, применяемыми для терапии ИБС; в качестве гепатопротекторного средства - сочетать с традиционными методами лечения гепатита.

Особые указания

В состав таблеток входит сахароза - 2.8 мг в одной таблетке, т.е. в максимальной суточно дозе (8таблеток) содержится 22.4 мг сахарозы, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Условия хранения

В сухом месте