Инструкция по применению
Тиотриазолин Раствор 25 мг 4 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Украина
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 25 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат

Состав

1 мл раствора для инъекций содержит: действующее вещество: морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат (тиотриазолин) 25 мг. вспомогательные вещества: вода для инъекций

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Хронический алкогольный гепатит минимальной и умеренной активности.
Хронический вирусный гепатит, жировая дистрофия печени, цирроз печени.
Токсические поражения печени, в т.ч. алкогольного, вирусного и лекарственного происхождения (антибиотики, противоопухолевые, противотуберкулезные, противовирусные ЛС, трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы и т.д.).

Способ применения и дозы

Парентерально. При хроническом гепатите Тиотриазолин в первые пять дней заболевания вводят внутримышечно по 2 мл 2,5% раствора 2-3- раза в день (2-3 раза по 50 мг), или внутривенно медленно, со скоростью 2 мл/мин по 4 мл 2,5% раствора (100 мг) или капельно со скоростью 20-30 капель в минуту (2 ампулы 2,5% раствора растворяют в 150-250 мл физиологического раствора). С пятого по двадцатый день лечения назначают Тиотриазолин в таблетках (100 мг 3 раза в день). Курс лечения – 20-30 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Тиотриазолин; детский возраст; почечная недостаточность; период беременности и лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Тиотриазолин, как правило, хорошо переносится. При клиническом применении Тиотриазолина наблюдались единичные случаи побочных реакций: Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, сухость во рту, вздутие живота; Со стороны центральной и периферической нервной системы: общая слабость, головокружение, шум в ушах; Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, повышение артериального давления, боль в области сердца, аритмии; Со стороны дыхательной системы: очень редко - одышка, приступы удушья. Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, лихорадка, очень редко - отек Квинке. Со стороны кожных покровов: зуд, гиперемия кожи, крапивница.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Тиотриазолин как кардиопротекторный препарат можно применять в комбинации с базисными средствами терапии ишемической болезни сердца. Как гепатопротекторное средство, может сочетатся с назначением традиционных методов лечения гепатитов соответствующей этиологии.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °C