Инструкция по применению
Тиотриазолин таблетки 200мг N90

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Украина
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 0,2 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат

Состав

Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат 200 мг;Вспомогательные вещества: крахмал картофельный 16 мг, повидон низкомолекулярный 8 мг, сахароза 5.6 мг, целлюлоза микрокристаллическая 8 мг, кальция стеарат 2.4 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь относительная биодоступность составляет 64.5%, период полуабсорбции – 0.28 ч, T1/2 - 1.3 ч, Cmax в плазме крови отмечается через 1.18 ч, связывание с белками плазмы крови не превышает 10%. После в/в введения Cmax в плазме крови отмечается через 0.1 ч, при в/м - через 0.84 ч. В значительном количестве накапливается в миокарде, тканях печени, селезенки, почек и прямой кишки, в незначительном количестве – в легких и тонком кишечнике. Выводится главным образом почками.

Показания

Хронический гепатит различной этиологии, цирроз печени.;ИБС: острый инфаркт миокарда (в составе комплексной терапии), стенокардия напряжения и покоя, постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, кардиомиопатии (в составе комплексной терапии), нарушения ритма сердца.; Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. нейроциркуляторная дистония), миокардиодистрофии, тонзилогенные кардиопатии (в составе комплексной терапии).;Острый вирусный гепатит, хронические гепатиты различной этиологии, цирроз печени.;Применение с целью детоксикации при приеме препаратов с выраженной гепатотоксичностью.

Способ применения и дозы

При приеме внутрь для взрослых разовая доза - 100-200 мг, частота приема - 3-4 раза /сут. Для детей - 10–20 мг/кг/сут в 3 приема.;В/м вводят по 50 мг 2-3 раза/сут.;В/в медленно вводят в дозе 100 мг 1 раз/сут.;В/в капельно вводят в дозе 20-50 мг.; Продолжительность курса лечения определяется индивидуально в зависимости от тяжести и течения заболевания.

Противопоказания

Почечная недостаточность, детский возраст до 5 лет, беременность, грудное вскармливание, повышенная чувствительность к тиотриазолину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Побочные эффекты возможны при в/м или в/в введении.;Редко: зуд, гиперемия кожи, лихорадка, кожная сыпь (уртикарная, папулезная, мелкоточечная, пятнистая); на фоне приема с другими препаратами описаны отдельные случаи крапивницы и ангионевротического отека, 1 случай анафилактического шока.;Очень редко (у пациентов, преимущественно пожилого возраста, при одновременном применении с другими препаратами): общая слабость, головокружение, шум в ушах, тахикардия, артериальная гипертензия, сухость во рту, тошнота, вздутие живота, рвота, одышка, удушье.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При приеме внутрь большого количества препарата - необходимо сделать промывание желудка. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Тиотриазолин в качестве кардиопротекторного средства можно комбинировать с базисными средствами, применяемыми для терапии ИБС; в качестве гепатопротекторного средства - сочетать с традиционными методами лечения гепатита.

Особые указания

В состав таблеток входит сахароза - 2.8 мг в одной таблетке, т.е. в максимальной суточно дозе (8таблеток) содержится 22.4 мг сахарозы, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Условия хранения

В сухом месте