Инструкция по применению
Типлито капсулы 8 мг 14 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тиоколхикозид
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 8 мг
Срок годности: 2 года

Описание

Типлито — рецептурный миорелаксант центрального действия в форме твердых желатиновых капсул. Одна капсула содержит 8 мг тиоколхикозида. В упаковке 14 капсул.

Действующее вещество

Тиоколхикозид

Состав

Действующее вещество: каждая капсула содержит 8 мг тиоколхикозида.
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, магния стеарат. Оболочка капсулы: желатин, краситель железа оксид желтый Е172, титана диоксид Е171, вода очищенная.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь неизмененный тиоколхикозид в плазме не обнаруживается. Он метаболизируется с образованием активного и неактивного метаболитов; их максимальные концентрации достигаются примерно через 1 час. Около 79% дозы выводится через кишечник и около 20% — почками.

Показания

Применяется у взрослых и подростков старше 16 лет в качестве дополнительной терапии в составе комплексного лечения болезненных мышечных спазмов при острой патологии позвоночника.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1 капсуле 8 мг каждые 12 часов, то есть 2 раза в день. Максимальная суточная доза — 16 мг. Капсулу проглатывать, запивая стаканом воды. Продолжительность лечения — 5–7 дней и не должна превышать 7 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к тиоколхикозиду или вспомогательным веществам; периферический паралич и мышечная гипотония; применение у женщин детородного возраста, не использующих эффективную контрацепцию; беременность; грудное вскармливание; возраст до 16 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания. Женщины детородного возраста должны использовать эффективные методы контрацепции во время лечения. Тиоколхикозид и его метаболиты могут влиять на деление клеток и потенциально снижать мужскую фертильность.

Побочные действия

Часто: сонливость, диарея, боль в животе. **Нечасто:** зуд, тошнота, рвота, аллергические кожные реакции. **Редко:** крапивница, возбуждение, кратковременная спутанность сознания, изжога. **Частота неизвестна:** ангионевротический отек, анафилактические реакции и шок, судороги, цитолитический и холестатический гепатит.

Передозировка

При передозировке возможны желудочно-кишечные нарушения, включая диарею и рвоту. Рекомендуются медицинское наблюдение и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследования лекарственных взаимодействий не проводились. Алкоголь может значительно усиливать сонливость. Возможно усиление нежелательных реакций при одновременном применении с другими миорелаксантами.

Особые указания

Не превышать рекомендованные дозу и продолжительность курса. При появлении диареи дозу уменьшают по согласованию с врачом. С осторожностью применять при нарушении функции печени, эпилепсии или риске судорог. Не употреблять алкоголь. Препарат содержит лактозу.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре **не выше 25 °C**.