Инструкция по применению
Тирамин Таблетки 155 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КЛИНИКА ИНСТИТ.БИОРЕГУЛЯЦ. И ГЕРОНТОЛОГИИ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40

Описание

Рекомендуется для поддержки функции щитовидной железы, а также для нормализации ее работы при различных нарушениях.

Состав

Питательные вещества, % Белки 73,8 Жиры 0,5 Углероды 4,2 Зола 7,1 Влага 14,4 Энергетическая ценность, ккал/100 г 316,5 Минеральные вещества, мг/г Алюминий 0,0097 Кобальт < 0,00034 Медь 0,01 Железо 0,3 Магний 1,6 Кальций 0,24 Калий 1,0 Натрий 30,0 Марганец 0,0016 Молибден 0,00035 Фосфор 2,9 Сера 11,0 Цинк 1,12 Свинец 0 Кадмий 0 Витамины, мг/кг Тиамин (B1) 2,46 Рибофлабин (B2) 6,9 Ниацин (PP) 6,75 Ретинол (A) 0,03 Токоферол (E) 0,07 Аминокислоты, нмоль/мг Аспарагиновая кислота 576 Треонин 311 Серин 468 Глутаминовая кислота 890 Пролин 652 Глицин 535 Аланин 628 Валин 628 Метионин 102 Изолейцин 195 Лейцин 669 Тирозин 179 Фенилаланин 315 Гистидин 123 Лизин 342 Аргинин 353

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Тирамин показан при различных нарушениях функции щитовидной железы, таких как: Гипофункция щитовидной железы (снижение функциональной активности железы) Гиперфункции щитовидной железы (повышение активности щитовидной железы, гипертиреоз, Базедова болезнь) Аутоиммунный тиреоидит (хроническое воспаление тканей щитовидной железы, болезнь Хашимото) Состояние после экстремальных стрессорных нагрузок Пред и послеоперационный период при операциях на щитовидной железе Жителям районов эндемичных по заболеваниям щитовидной железы вследствие дефицита йода Лицам пожилого возраста для поддержания функции щитовидной железы

Способ применения и дозы

Тирамин рекомендуется принимать по 1-3 таблетки, за 10–15 минут до еды, 2-3 раза в день, в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Тирамин не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.