Инструкция по применению
Тизерцин Таблетки 25 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Эгис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Левомепромазин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 25 мг
Срок годности: 60

Описание

Круглые, слегка двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой, белого цвета, без запаха.

Действующее вещество

Левомепромазин

Состав

Действующее вещество: левомепромазина малеат 33,8 мг (эквивалентный 25,00мг левомепромазина), _вспомогательные вещества:_ магния стеарат 1 мг, натрия крахмала гликолят 2 мг, повидон К-25 8 мг, целлюлоза микрокристаллическая 10 мг, крахмал картофельный 15,2 мг, лактоза 40 мг, оболочка (титана диоксид 0,758 мг, гипромеллоза 2,632 мг, диметикон 0,355 мг, магния стеарат 0,255 мг).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Максимальная концентрация препарата в плазме крови достигается через 1-3 часа после приема внутрь. Проходит через гистогематические барьеры, включая гематоэнцефалический барьер, распределяется в органах и тканях. Левомепромазин быстро метаболизируется в печени путем деметилирования с образованием сульфатных и глюкуронидных конъюгатов, которые выводятся с мочой. Метаболит, образующийся в результате деметилирования (N-дезметиломоно-метотримепразин), обладает фармакологической активностью, остальные метаболиты неактивны. Небольшая часть введенной дозы (1%) выводится в неизменном виде с мочой и калом. Период полувыведения - 15-30 часов.

Показания

Психомоторное возбуждение различной этиологии: \- при шизофрении (острой и хронической) \- при биполярных расстройствах \- при сенильных, интоксикационных и прочих психозах \- при олигофрении \- при эпилепсии **а также другие психические расстройства, протекающие с:** \- ажитацией \- тревогой \- паникой \- фобиями \- стойкой бессонницей **Усиление действия анальгетиков, средств для общей анестезии, антигистаминных препаратов.** **Болевой синдром (невралгия тройничного нерва, неврит лицевого нерва, опоясывающий лишай).**

Способ применения и дозы

Внутрь начиная с суточной дозы 25-50 мг на несколько приёмов (максимальная часть суточной дозы должна назначаться перед сном), ежедневно увеличивая её на 25-50 мг до улучшения состояния больного. У резистентных к другим нейролептикам больных суточную дозу можно наращивать быстрее, прибавляя по 50-75 мг в сутки. Средние суточные дозы составляют 200-300 мг. После улучшения состояния пациента дозу следует снизить до поддерживающей, величина которой определяется индивидуально. В амбулаторной практике больным с невротическими расстройствами назначают в суточной дозе 12,5-50 мг (1/2-2 таблетки). Больным с психозами, при выраженном психомоторном возбуждении, целесообразно начинать терапию левомепромазином с парентерального введения. Для предупреждения развития ортостатического коллапса во время лечения требуется соблюдение постельного режима.

Противопоказания

\- одновременный прием антигипертензивных средств, \- повышенная чувствительность к фенотиазинам, \- передозировка препаратов, вызывающих торможение ЦНС (алкоголь, общие анестетики, снотворные), \- закрытоугольная глаукома, \- задержка мочи, \- Болезнь Паркинсона, \- рассеянный склероз, \- миастения, гемиплегия, \- хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, \- выраженная почечная/печеночная недостаточность, \- выраженная артериальная гипотензия, \- угнетение костномозгового кроветворения (гранулоцитопения), \- порфирия, \- кормление грудью, \- детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Препарат не следует применять во время беременности, за исключением случаев, когда проведено тщательное сопоставление риска для плода и пользы для матери. Кормление грудью Левомепромазин проникает в грудное молоко. В связи с этим, а также при отсутствии контролируемых исследований, его применение при грудном вскармливании противопоказано. При необходимости принимать препарат в период лактации следует решить вопрос о прекращении кормления грудью.

Передозировка

Симптомы: Артериальная гипотензия, нарушения проводимости в сердечной мышце (удлинение интервала QT, желудочковая тахикардия типа "пируэт", предсердно-желудочковая блокада), угнетение сознания различной степени выраженности (вплоть до комы), экстрапирамидные симптомы, седативный эффект, эпилептические припадки. Лечение: реанимационные мероприятия, симптоматическая терапия. Специфический антидот не известен. Форсированный диурез, гемодиализ и гемоперфузия не эффективны.

Условия хранения

Препарат относится к списку №1 сильнодействующих веществ Постоянного комитета по контролю наркотиков МЗ РФ. Хранить при температуре 15-25° С, в недоступном для детей месте.