Инструкция по применению
Тмин Плоды Иван-чай 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Плоды цельные
Страна: Россия
Производитель: Иван-Чай
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тмина обыкновенного плоды
Количество в упаковке: 1

Описание

Плод - вислоплодник, состоящий из двух полуплодиков (меликарпиев), чаще распавшийся. Меликарпий продолговатой формы, часто более или менее серповидно-изогнутый, сжатый с боков, к верхушке слегка суженный, с надпестичным диском и остатком столбика. Наружная сторона меликарпия выпуклая, внутренняя - плоская. Каждый меликарпий имеет пять сильно выступающих продольных ребрышек: три из них находятся на выпуклой стороне, два по бокам. В меликарпии одно семя, сросшееся с околоплодником. Длина плодов 3-7 мм, ширина 1-1,5 мм.Цвет плодов темно-коричневый с тонкими светлыми полосками на ребрах. Запах сильный, ароматный. Вкус водного извлечения жгучий, горьковатый, пряный.

Действующее вещество

Тмина обыкновенного плоды

Состав

Тмина плоды.ХарактеристикаПлоды тмина содержат жирное масло, белки, флавоноиды (кверцетин), дубильные вещества, эфирное масло.

Форма выпуска

Плоды цельные

Показания

В составе комплексной терапии: боль в кишечнике спастического характера, метеоризм, запор.

Способ применения и дозы

Около 10 г (1 столовая ложка) плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.Настой принимают внутрь в теплом виде 3-4 раза в сутки после еды: взрослые и дети старше 12 лет - по 1/3 стакана, дети от 7 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки, дети от 3 до 6 лет - по 1 столовой ложке, дети до 3-х лет - по 1/2-1 чайной ложке. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.Хранить в недоступном для детей месте.