Инструкция по применению
Тобропт капли глазные 0,3% 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Румыния
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тобрамицин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.3%
Срок годности: 36.0



Описание

Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Действующее вещество

Тобрамицин

Состав

Активное вещество: тобрамицин - 3 мгВспомогательные вещества: кислота борная, натрия хлорид, натрия сульфат безводный, тилоксапол, бензалкония хлорид, 1 М раствор натрия гидроксида или 0,5 М раствор кислоты серной, вода очищенная.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Хорошо проникает через гематоофтальмический барьер. Системная абсорбция при инстилляции в конъюнктивальный мешок - незначительная. При закапывании в конъюнктивальный мешок обнаруживаются в терапевтической концентрации в строме роговицы, влаге передней камеры, стекловидном теле в течение 6 часов. Аминогликозиды не метаболизируются, выделяются почками.

Показания

Инфекции глаза и его придатков: блефарит, конъюнктивит, кератоконъюнктивит, блефароконъюнктивит, кератит, эндофтальмит, дакриоцистит, мейбомит (ячмень). Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений в офтальмологии.

Способ применения и дозы

По 1 капле каждые 4 ч, при острых инфекциях можно повторять закапывание через каждые 30 мин или 1 ч.При нетяжелом инфекционном процессе препарат закапывают по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (или глаз) каждые 4 ч. В случае развития острого тяжелого инфекционного процесса (эндофтальмит) препарат закапывают каждые 30-60 мин, по мере уменьшения воспаления уменьшают частоту инстилляций препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность, лактация.

Побочные действия

При применении препарата возможно проявление аллергических реакций:в 15% случаев: жжение, парестезии, зуд конъюнктивы,в 1-5%: гиперемия слизистой оболочки глаза, ощущение инородного тела в глазу, слезотечение,менее 1%: блефарит, кератит, отек век, боль в глазу, хемоз, отложение кристаллов, изъязвление роговицы.

Передозировка

Симптомы: точечный кератит, эритема, повышенное слезотечение, зуд и отек века. Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

В случае одновременного назначения препарата Тобропт с системными антибиотиками из группы аминогликозидов возможно усиление системных побочных эффектов (нефротоксического, ототоксического действия, нарушения минерального обмена и гемопоэза).

Особые указания

Тобропт предназначен только для местного применения.Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком пипетки глаза для сохранения стерильности раствора.Длительное применение препарата Тобропт, как и в случае использования других антибиотиков, может привести к усиленному росту невосприимчивых микроорганизмов (в том числе грибов). Рекомендуется делать посев после окончания лечения, если клинический результат неудовлетворительный.Пациенты, использующие жесткие контактные линзы, должны применять глазные капли только после снятия контактных линз. Линзы можно надевать через 15 минут после закапывания препарата.В период лечения нельзя носить мягкие контактные линзы.При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.Перед применением следует встряхнуть содержимое флакона.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата Тобропт не вызывает повышенной утомляемости и нарушений зрения, поэтому не влияет на способность вождения автотранспорта и управления механизмами. Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой сразу после закапывания препарата.

Условия хранения

В сухом месте