Инструкция по применению
Томицид раствор для местного применения 90мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Биомед
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Томицид - раствор для местного и наружного применения светло-коричневого цвета, прозрачная, с кисловатым вкусом.

Состав

Томицид (стерильный продукт метаболизма непатогенного стрептококка Streptococcus sp. ТОМ-1606)

Форма выпуска

Раствор

Показания

— варикозное расширение вен с язвами и без.— ангина.— пиодермия.— открытые раны.— нагноение ран.— профилактика нагноений послеоперационных ран.— другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки.— декубитальная язва.— другие язвы нижней конечности.Допускается применение препарата при ассоциации грамположительных кокков с другими возбудителями.

Способ применения и дозы

Препарат применяется наружно.Лечение ангинПри лечении ангин Томицид применять в виде полосканий. Однократная доза Томицида для полосканий составляет 10-15 мл. Препарат рекомендуется использовать в подогретом виде (от 37 до 42°С)Контакт с поверхностью слизистой должен быть 3-5 мин. Периодичность полосканий 5-6 раз в сутки. Срок применения - до исчезновения симптомов заболевания.Лечение пиодермииТомицид применяется при различных формах пиодермии:- при поверхностных стрепто-стафилодермиях.- при глубоких формах пиодермии (фурункулы, карбункулы, гидраденит).- при вторичных формах пиодермии, осложняющих течение различных дерматозов (экзема, нейродермит).- при трофических язвах, осложненных вторичной гнойной инфекцией.Лечение проводится посредством наложения влажной повязки, пропитанной Томицидом, на пораженные очаги 2-3 раза в день, до исчезновения симптомов заболевания.Лечение гнойных ранПеред применением Томицида рекомендуется полностью удалить из раны гнойнонекротический субстрат. Затем раневая полость рыхло тампонируется с Томицидом. Перевязки проводятся 1 раз в сутки до появления в ране кровоточащих сочных грануляций. Последующее лечение проводится Томицидом в сочетании с маслом (вазелиновым или касторовым) в равных соотношениях, до полного заживления раны.Количество Томицида, используемое на 1 перевязку, зависит от величины и формы гнойной полости и составляет, в среднем, 5-10 мл.Томицид можно использовать для промывания закрытых гнойных полостей (свищевые ходы, хронический остеомиелит и др.), локализующихся в соединительной и костной ткани. Профилактика нагноений послеоперационных ранДля профилактики нагноений послеоперационных ран Томицид следует применять в виде влажных повязок, накладываемых на раневую поверхность непосредственно после оперативного вмешательства 1 раз в сутки в течение первых 3-5 дней. После этого срока при отсутствии явлений воспаления применение Томицида следует прекратить.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность, период грудного вскармливания также не являются противопоказаниями для применения Томицида.

Взаимодействие с другими препаратами

Допускается применение Томицида совместно с другими лекарственными препаратами (антибиотиками, сульфаниламидами).

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре