Инструкция по применению
Тонзилар Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алкой
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы, белого, белого с сероватым или белого с желтоватым оттенком цвета, с риской.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну таблетку): Активные компоненты: Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D6, Lachesis mutus (Lachesis) (лахезис мутус (лахезис)) D12, Phytolacca americana (Phytolacca) (фитолякка американа (фитолякка)) D3. Вспомогательные компоненты: лактоза моногидрат 0,282 г, крахмал картофельный 0,015 г, кальция стеарат 0,003 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии острого и обострения хронического тонзиллита, фарингита; для профилактики обострения хронического тонзиллита и фарингита.

Способ применения и дозы

Для лечения острого и обострения хронического тонзиллита, фарингита Стандартная схема: Принимать по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывать под языком. Детям с 3 до 7 лет принимать по 1/2 таблетки 3 раза в день, детям старше 7 лет - по 1 таблетке 3 раза в день. При остром состоянии - детям с 3 до 7 лет по 1/2 таблетки каждые 2 часа (не более 8 раз), детям старше 7 лет и взрослым - по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз) - в течение 1-2 суток до купирования острых симптомов. Затем 3-5 раз в день в течение 7 дней, далее до 28 дня 1-2 раза в день. Для профилактики обострения хронического тонзиллита и фарингита Детям от 3 до 7 лет по 1/2 таблетки 2 раза в день, детям старше 7 лет и взрослым - по 1 таблетке 2 раза в день в течение 1-2 месяцев. При необходимости курс повторить с перерывом в 1 месяц (2-3 курса в год).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Детский возраст до 3 лет. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

До настоящего времени информация о случаях побочных эффектов не поступала.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами и т.п.). Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0,074 хлебной единицы. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Условия хранения

от 2# до 25#