Инструкция по применению
Тонзилгон Н Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Драже
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея корни+Ромашки цветки+Хвоща трава+Грецкого ореха листья+Тысячелистника трава+Дуба кора+Одуванчика лекарственного трава
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36.0

Описание

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, светло-голубого цвета, покрытые оболочкой.

Действующее вещество

Алтея корни+Ромашки цветки+Хвоща трава+Грецкого ореха листья+Тысячелистника трава+Дуба кора+Одуванчика лекарственного трава

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Алтея корни 8,0 мг Ромашки цветки 6,0 мг Хвоща трава 10,0 мг Грецкого ореха листья 12,0 мг Тысячелистника трава 4,0 мг Дуба кора 4,0 мг Одуванчика лекарственного трава 4,0 мг Вспомогательные компоненты: Лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, крахмал картофельный, стеариновая кислота, глюкозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный. Оболочка: кальция карбонат, касторовое масло, декстрин, глюкоза, алюминиевый лак индигокармина Е 132, крахмал кукурузный, воск горный гликолевый, повидон К 25, повидон К 30, сахароза, шеллак, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, титана диоксид Е 171.

Форма выпуска

Драже

Показания

Острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит). Профилактика осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Способ применения и дозы

Внутрь. Таблетки проглатывают целиком, не разжевывая, при необходимости запивая водой. В острый период развития заболевания: Взрослые: по 2 таблетки 5 - 6 раз в день. Дети школьного возраста (старше 6 лет): по 1 таблетке 5 - 6 раз в день. После исчезновения острых симптомов заболевания (боль в горле) следует продолжить лечение препаратом в течение еще 1 недели. После исчезновения острых симптомов: Взрослые: по 2 таблетки 3 раза в день. Дети школьного возраста (старше 6 лет): по 1 таблетке 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к растениям семейства сложноцветных, детский возраст до 6 лет. Пациентам с редкой наследственной формой непереносимости лактозы, непереносимостью фруктозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы, применение препарата противопоказано (из-за содержания в препарате лактозы и сахарозы).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны: тошнота, рвота. Возможны аллергические реакции. При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Если при применении препарата в течение 7 дней симптомы заболевания сохраняются или состояние больного ухудшается, следует обратиться к врачу. Одна таблетка содержит менее 0,03 учитываемых «хлебных единиц» (ХЕ). Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте