Инструкция по применению
Тонзилгон Н Капли 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея корни+Ромашки цветки+Хвоща трава+Грецкого ореха листья+Тысячелистника трава+Дуба кора+Одуванчика лекарственного трава
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Алтея корни+Ромашки цветки+Хвоща трава+Грецкого ореха листья+Тысячелистника трава+Дуба кора+Одуванчика лекарственного трава

Состав

Действующее вещество: 29 г водно-спиртового экстракта из смеси лекарственного растительного сырья: Алтея корни 0, 4 г Ромашки цветки 0, 3 г Хвоща трава 0, 5 г Грецкого ореха листья 0, 4 г Тысячелистника трава 0, 4 г Дуба кора 0, 2 г Одуванчика лекарственного трава 0, 4 гВспомогательные вещества: Вода очищенная 71 гКонцентрация действующего вещества: entianae radix (корня горечавки) 0, 2 г, Primulae flos (цветков первоцвета) 0, 6 г, Rumicis herba (травы щавеля) 0, 6 г, Sambuci flos (цветков бузины) 0, 6 г, Verbenae herba (травы вербены) 0, 6 г. Содержание этанола: 16, 0–19, 0 % (в объемном отношении)

Форма выпуска

Капли

Показания

Острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит). Профилактика осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Способ применения и дозы

Внутрь. Капли для приема внутрь принимают в неразбавленном виде, некоторое время подержав во рту перед проглатыванием. В острый период развития заболевания: Взрослые: по 25 капель 5-6 раз в день. Дети школьного возраста (старше 6 лет): по 15 капель 5-6 раз в день. Дети дошкольного возраста (старше 1 года): по 10 капель 5-6 раз в день.После исчезновения острых симптомов заболевания (боль в горле) следует продолжить лечение препаратом в течение еще 1 недели. После исчезновения острых симптомов: Взрослые: по 25 капель 3 раза в день. Дети школьного возраста (старше 6 лет): по 15 капель 3 раза в день. Дети дошкольного возраста (старше 1 года): по 10 капель 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к растениям семейства сложноцветных, алкоголизм (в том числе после антиалкогольного лечения), детский возраст (до 1 года) - в связи с содержанием этилового спирта в препарате.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны: тошнота, рвота. Возможны аллергические реакции. При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.Симптомы: возможно усиление побочных эффектов со стороны ЖКТ.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Содержание в препарате этилового спирта составляет от 16% до 19.5% (в объемном отношении). В максимальной разовой дозе (25 капель) содержание абсолютного этилового спирта составляет 0.21 г; в максимальной суточной дозе (25 капель 6 раз /сут) – 1.26 г.Если при применении препарата в течение 7 дней симптомы заболевания сохраняются или состояние больного ухудшается, следует обратиться к врачу.В процессе хранения препарата возможно легкое помутнение жидкости или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.При использовании флакона следует держать его в вертикальном положении.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в связи с содержанием этилового спирта препарате).