Инструкция по применению
ТОНЗИЛГОН Н ТАБЛ N25

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 25



Описание

.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Препарат Тонзилгон® Н содержит: Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит измельченное лекарственное растительное сырье (порошок): 8 мг алтея лекарственного корней _(__Althaeae_ _officinalis_ _radices__),_ 6 мг ромашки аптечной цветков _(__Chamomillae_ _recutita_ _flores__),_ 10 мг хвоща полевого травы _(__Equiseti_ _arvensis_ _herba__),_ 12 мг ореха грецкого листьев _(__Juglandis_ _regia_ _folia__),_ 4 мг тысячелистника обыкновенного травы _(__Achilleae_ _millefolii_ _herba__),_ 4 мг дуба коры _(__Quercus_ _cortex__),_ 4 мг одуванчика лекарственного травы _(__Taraxaci_ _officinalis_ _herba__)._ Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: ядро таблетки - глюкозы моногидрат, лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный безводный, стеариновая кислота, оболочка таблетки - кальция карбонат (Е 170), клещевины обыкновенной семян масло жирное (касторовое масло), декстрин, глюкоза жидкая (декстрозный эквивалент 42,0%), крахмал кукурузный, воск горный гликолиевый, повидон К 25, повидон К 30, сахароза, шеллак, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Тонзилгон® Н применяется у взрослых и детей от 6 до 18 лет при: * острых и хронических заболеваниях верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит), * профилактике осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или с работником аптеки. Рекомендуемая доза Возраст В острый период заболевания После исчезновения острых симптомов Дети в возрасте 6-11 лет 1 таблетка 5-6 раз в день 1 таблетка 3 раза в день Дети в возрасте 12 лет и старше, взрослые 2 таблетки 5-6 раз в день 2 таблетки 3 раза в день Применение у детей Безопасность и эффективность у детей в возрасте от 0 до 6 лет на настоящий момент не установлены. Данные отсутствуют. Путь и (или) способ введения Препарат Тонзилгон® Н принимают внутрь. Таблетку следует проглатывать не разжевывая, запивая достаточным количеством воды (например, 1 стакан). Продолжительность терапии Длительность курса лечения зависит от течения заболевания. После исчезновения острых симптомов заболевания (боль в горле) следует продолжить лечение препаратом в течение еще 1 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Обратите внимание на информацию в разделе «Особые указания». Если Вы забыли принять препарат Тонзилгон® Н Если Вы пропустили очередной прием препарата, не принимайте в следующий раз двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу, а продолжайте прием как описано в настоящем листке-вкладыше. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу. Если улучшение не наступило через 7 дней лечения, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Тонзилгон® Н: * если у Вас аллергия на алтея лекарственного корни, ромашки аптечной цветки, хвоща полевого траву, ореха грецкого листья, тысячелистника обыкновенного траву, дуба кору, одуванчика лекарственного траву, а также на другие растения семейства сложноцветных, например, полынь, тысячелистник, хризантему, маргаритку или на любые другие компоненты препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Нет достаточных данных о применении препарата Тонзилгон® Н у беременных и кормящих женщин. Исследования репродуктивной токсичности на животных не проводились. Неизвестно, выделяются ли активные компоненты препарата Тонзилгон® Н в материнское молоко. Применение препарата в случае, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка, возможно только после консультации с врачом. Данные о влиянии препарата Тонзилгон® Н на фертильность отсутствуют.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Если у Вас отмечаются симптомы аллергической реакции (такие как кожные высыпания, покраснение кожи, зуд), прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. Вам может потребоваться медицинская помощь. Другие возможные нежелательные реакции _Редко (могут наблюдаться не более чем у 1 из 1000 человек):_ * расстройства желудочно-кишечного тракта (такие как боль в животе, тошнота, рвота) В случае возникновения описанных выше или других нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Тонзилгон® Н больше, чем следовало До настоящего времени не сообщалось о случаях интоксикации при передозировке препарата. В случае передозировки побочные эффекты, описанные в разделе «Побочные эффекты», могут быть более выраженными. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Лечение при передозировке - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. Исследования взаимодействия с другими лекарственными препаратами не проводились. Прием других препаратов может повысить риск нежелательных реакций, поэтому врачу важно знать о любых принимаемых Вами лекарствах, в том числе продаваемых 'false, а также витаминах, лекарственных растениях или биологически активных добавках.

Особые указания

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или с работником аптеки. Рекомендуемая доза Возраст В острый период заболевания После исчезновения острых симптомов Дети в возрасте 6-11 лет 1 таблетка 5-6 раз в день 1 таблетка 3 раза в день Дети в возрасте 12 лет и старше, взрослые 2 таблетки 5-6 раз в день 2 таблетки 3 раза в день Применение у детей Безопасность и эффективность у детей в возрасте от 0 до 6 лет на настоящий момент не установлены. Данные отсутствуют. Путь и (или) способ введения Препарат Тонзилгон® Н принимают внутрь. Таблетку следует проглатывать не разжевывая, запивая достаточным количеством воды (например, 1 стакан). Продолжительность терапии Длительность курса лечения зависит от течения заболевания. После исчезновения острых симптомов заболевания (боль в горле) следует продолжить лечение препаратом в течение еще 1 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Обратите внимание на информацию в разделе «Особые указания». Если Вы забыли принять препарат Тонзилгон® Н Если Вы пропустили очередной прием препарата, не принимайте в следующий раз двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу, а продолжайте прием как описано в настоящем листке-вкладыше. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу. Если улучшение не наступило через 7 дней лечения, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу. Перед приемом препарата

Тонзилгон® Н проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Если симптомы заболевания сохраняются более 7 дней, ухудшаются (возникает одышка, лихорадка, отмечается появление гноя и/или крови в мокроте) или повторяются периодически, необходимо обратиться за консультацией к врачу. Если у Вас сахарный диабет, Вам необходимо знать, что одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,03 учитываемых «Хлебных Единиц» (ХЕ). Дети Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности, поскольку эффективность и безопасность у данной возрастной группы не установлены. Препарат Тонзилгон® Н содержит глюкозу, лактозу и сахарозу Если Ваш врач сказал Вам, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат. Возможен прием препарата в лекарственной форме капли для приема внутрь, который не содержит вышеуказанные сахара. Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. * Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача. * Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. * Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки. * Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. * Если состояние не улучшается или ухудшается через 7 дней, Вам следует обратиться к врачу. Применение препарата Тонзилгон® Н не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.

Условия хранения

Для данного лекарственного препарата не требуются специальные условия хранения. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.