Инструкция по применению
Тонзилла композитум раствор для внутримышечного введения гомеопатический 2,2 мл ампулы 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100



Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Tonsilla suis (тонзилла суис) D28 22 мкл, Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6 22 мкл, Nodus lymphaticus suis (нодус лимфатикус суис) D8 22 мкл, Medulla ossis suis (медулла оссис суис) D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл, Splen suis (сплен суис) D10 22 мкл, Hypothalamus suis (гипоталямус суис) D10 22 мкл, Hepar suis (гепар суис) D10 22 мкл, Embryo suis (эмбрио суис) D13 22 мкл, Cortex glandulae suprarenalis suis (кортекс гляндуле супрареналис суис) D13 22 мкл, Pyrogenium-Nosode (пирогениум-Нозоде) D198 22 мкл, Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D13 22 мкл, Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6 22 мкл, Acidum sarcolacticum (ацидум сарколяктикум) D6 22 мкл, Echinacea (эхинацея) D4 22 мкл, Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D10 22 мкл, Aesculus hippocastanum (эскулюс хиппокаштанум) D6 22 мкл, Kalium stibyltartaricum (калиум стибилтартарикум) D6 22 мкл, Solanum dulcamara (солянум дулькамара) D4 22 мкл, Levothyroxinum (левотироксинум) D13 22 мкл, Coccus cacti (коккус какти) D6 22 мкл, Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D10 22 мкл, Gentiana lutea (гентиана лютеа) D6 22 мкл, Geranium robertianum (гераниум робертианум) D6 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D13 22 мкл, Barium carbonicum (бариум карбоникум) D28 22 мкл, Conium maculatum (кониум макулятум) D4 22 мкл, Galium aparine (галиум апарине) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Psorinum-Nosode (псоринум-Нозоде) D28 22 мкл, Вспомогательные вещества: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

В составе комплексной терапии хронического тонзиллита

Способ применения и дозы

Если не прописано иначе, 1 раз в неделю по 1 ампуле внутримышечно. Средний курс терапии 5 недель. Длительность лечения определяется врачом. Как вскрыть ампулу? Цветная Точка Должна Находиться Вверху! Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания. После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в месте нанесения цветной точки.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагенозы, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания, синдром приобретенного иммунодефицита, вирус иммунодефицита человека и другие хронические вирусные заболевания), в связи с недостаточностью клинических наблюдений. Известная повышенная чувствительность к Echinacea (Эхинацея) или иным растениям семейства сложноцветных. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Применение при беременности и лактации Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

При применении препарата могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности, иногда повышенное слюноотделение. При появлении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).