Инструкция по применению
Тонзилотрен Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 60



Описание

Плоскоцилиндрической формы таблетки белого или почти белого цвета, с фаской, без запаха или с характерным запахом. Возможно наличие одиночных вкраплений темно-серого цвета.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Таблетки - 1 таб.: активные компоненты: Atropinum sulfuricum (атропинум сульфурикум) D5 - 12,50 мг, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D3 - 10,0 мг, Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D4 - 50,0 мг, Acidum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D2 - 5,0 мг, Hydrargyrum biiodatum (Mercurius bijodatus) (гидраргирум бииодатум (меркуриус бийодатус)) D8 - 25,0 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 122,5 мг, сахароза - 24,0 мг, магния стеарат -1,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Острая катаральная, лакунарная или фолликулярная ангина, хронический тонзиллит, ускорение заживления слизистой оболочки глотки после удаления миндалин (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать, медленно рассасывая в полости рта, за полчаса до еды или через полчаса после еды. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды (1 столовая ложка). При остром течении заболевания взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз в день) в течение 1-2 дней до наступления улучшения, далее по 1-2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления. Детям от 6 до 12 лет - по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 6 раз в день) в течение 1-2 дней до наступления улучшения, далее по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления. Детям от 3 до 6 лет - по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления. При хроническом тонзиллите взрослым и детям старше 12 лет препарат следует принимать по 1-2 таблетке 3 раза в день, детям от 3 до 12 лет - по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения 6-8 недель. При хроническом тонзиллите рекомендуется проводить повторные курсы лечения (каждые 6-8 недель) после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; повышенная чувствительность к хрому или ртути, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы. Детский возраст до 3 лет по причине недостаточности соответствующих клинических данных. С осторожностью: пациенты с сахарным диабетом, при гипертиреозе.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и в период грудного вскармливания применять препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (в том числе кожная сыпь, зуд), реакции индивидуальной непереносимости. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. После применения может наблюдаться повышенное слюноотделение. В этом случае следует снизить дозировку или прекратить прием препарата. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Условия хранения

При комнатной температуре