Инструкция по применению
Трамадол Капсулы 100 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Трамадол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 24

Описание

Твердая желатиновая капсула № 2. Корпус капсулы белого цвета, крышечка красного цвета. Содержимое капсулы - порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Трамадол

Состав

Одна капсула содержит: _Действующее вещество:_ трамадола гидрохлорид - 100,0 мг _Вспомогательные вещества:_ лактозы моногидрат - 66,57 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102) - 16,58 мг, магния стеарат - 1,85 мг Капсула твердая желатиновая № 2 - 63,0 мг Корпус капсулы: титана диоксид (Е 171) - 2 %, желатин - до 100 % Крышечка капсулы: титана диоксид (Е 171) - 1 %, краситель железа оксид красный (Е 172) - 0,5 %, краситель железа оксид желтый (Е 172) - 1 %, краситель пунцовый \[Понсо 4 R\] (Е 124) - 0,5269 %, желатин - до 100 %.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

\- Болевой синдром средней и высокой интенсивности различной этиологии (например, боли у онкологических пациентов, при травмах, в послеоперационном периоде); \- болезненные диагностические и терапевтические мероприятия.

Противопоказания

\- Повышенная чувствительность к действующему веществу и к любому из вспомогательных веществ; \- острая интоксикация алкоголем, снотворными препаратами, анальгетиками, опиоидами или другими психотропными средствами; \- одновременное применение трамадола с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО), а также в течение 14 дней после окончания их приема; \- эпилепсия, не поддающаяся адекватному медикаментозному контролю; \- применение в качестве препарата для лечения синдрома отмены опиоидов; \- беременность, период грудного вскармливания; \- детский возраст до 14 лет; \- дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Передозировка

При передозировке трамадола следует ожидать симптомов, характерных для опиоидных анальгетиков центрального действия. _Жалобы и симптомы:_ миоз, рвота, коллапс, расстройства сознания вплоть до комы, судороги, угнетение дыхательного центра вплоть до остановки дыхания (апноэ). _Лечение:_ при передозировке препарата в лекарственной форме для приема внутрь, в первую очередь необходимо обеспечить освобождение желудка от еще не всосавшегося препарата (искусственная рвота, промывание желудка). Также необходимо обеспечение проходимости дыхательных путей, подержание дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности. При угнетении дыхательного центра вводится налоксон повторными дозами, так как продолжительность его действия короче, чем действие трамадола. При судорогах вводится диазепам. Гемодиализ и гемофильтрация малоэффективны.

Условия хранения

В соответствии с правилами хранения сильнодействующих веществ. При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.