Инструкция по применению
Трамадол Капсулы 50 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Трамадол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 36

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 2, корпус капсулы белого цвета, крышечка голубого цвета. Содержимое капсулы — порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Трамадол

Состав

Одна капсула содержит: _Действующее вещество:_ Трамадола гидрохлорид - 50,0 мг. _Вспомогательные вещества:_ лактозы моногидрат - 66,57 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102)- 66,58 мг, магния стеарат - 1,85 мг. Капсула твердая желатиновая № 2 - 61,0 мг. Корпус капсулы: титана диоксид (Е 171) - 2 %, желатин до 100 %. Крышечка капсулы: краситель индигокармин (Е 132) - 0,1333 %, титана диоксид (Е 171) - 1 %, желатин до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Болевой синдром средней и высокой интенсивности различной этиологии (например, боли у онкологических больных, при травмах и в послеоперационном периоде.

Противопоказания

\- повышенная чувствительность к трамадолу или любым другим компонентам препарата; \- острая интоксикация алкоголем, снотворными препаратами, анальгетиками, опиоидами или другими психотропными средствами; \- применение ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), а также менее 14 дней после окончания их приема; \- эпилепсия, не поддающаяся адекватному медикаментозному контролю; \- беременность, период грудного вскармливания; \- детский возраст до 14 лет; непереносимость галактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозноймальабсорбции; \- противопоказано применение трамадола в качестве препарата для лечения синдрома «отмены» наркотиков.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Трамадол проникает через плацентарный барьер. Трамадол не следует применять во время беременности, так как убедительных доказательств безопасности применения трамадола во время беременности у человека не получено. Длительное применение трамадола при беременности может привести к развитию симптомов «отмены» у новорожденного. _Грудное вскармливание_ Трамадол не рекомендуется применять во время лактации в связи с отсутствием данных по безопасности. Около 0,1 % дозы трамадола, введенной матери, выводится с молоком во время кормления грудью. Данные о влиянии трамадола на фертильность отсутствуют.

Передозировка

При передозировке трамадола следует ожидать симптомы, характерные для опиоидных анальгетиков центрального действия. _Симптомы:_ миоз, рвота, коллапс, расстройства сознания вплоть до комы, судороги, угнетение дыхательного центра до апноэ. Л_ечение:_ обеспечение проходимости дыхательных путей. Поддержание дыхания и деятельности сердечно-сосудистой системы в зависимости от симптоматики. При нарушении дыхания вводится налоксон. При судорогах следует внутривенно вводить диазепам. При передозировке препарата в лекарственных формах для приема внутрь необходимо провести промывание желудка и назначить активированный уголь в течение первых двух часов после передозировки. После приема особенно больших доз препарата в капсулах, удаление содержимого желудка может быть эффективно и в более поздние сроки. Гемодиализ и гемофильтрация малоэффективны.

Условия хранения

В соответствии с правилами хранения сильнодействующих веществ. При температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.