Инструкция по применению
Трамадол Таблетки 100 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Органика
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Трамадол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60

Описание

Таблетки белого или белого со слабым желтоватым оттенком цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Действующее вещество

Трамадол

Состав

таблетка содержит действующее вещество - трамадола гидрохлорид 100 мг, вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 100 мг, лактозы моногидрат (сахар молочный) - 295 мг, магния стеарат - 5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Болевой синдром средней и высокой интенсивности различной этиологии (например, боли у онкологических больных, при травмах и в послеоперационном периоде).

Противопоказания

Гиперчувствительность к трамадолу и/или любому компоненту препарата; отравление алкоголем, снотворными лекарственными средствами, наркотическими анальгетиками и другими психоактивными лекарственными средствами; детский возраст (до 14 лет); прием ингибиторов МАО, а также в течении 14 дней после окончания их приема; эпилепсия, не поддающаяся адекватному медикаментозному контролю; противопоказано применение трамадола в качестве препарата для лечения синдрома "отмены" наркотиков; наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); беременность; в период грудного вскармливания препарат может быть назначен только по жизненным показаниям. В случае однократного приема препарата нет необходимости в прерывании кормления грудью.

Передозировка

Симптомы: миоз или мидриаз, рвота, тахикардия, повышение артериального давления, коллапс, угнетение сознания (вплоть до комы), судороги, угнетение дыхания (вплоть до апноэ). _Лечение_: обеспечение проходимости дыхательных путей (интубация), поддержание дыхания и сердечно-сосудистой системы в зависимости от симптоматики. Антидотом при угнетении дыхательного центра является налоксон, который вводят повторными дозами, т.к. продолжительность его действия короче, чем действие трамадола. Для купирования судорожного синдрома применяются бензодиазепины. При передозировке препарата в лекарственных формах для приема внутрь необходимо провести промывание желудка и назначить активированный уголь в течении первых двух часов после передозировки. После приема особенно больших доз препарата в таблетках, удаление содержимого желудка может быть эффективным и в более поздние сроки. Гемодиализ и гемофильтрация малоэффективны.

Условия хранения

Список сильнодействующих веществ. В защищенном от света месте при температуре не выше 30 оС. Хранить в недоступном для детей месте.