Инструкция по применению
Трансулоза гель 150г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Франция
Производитель: МАЙОЛИ СПИНДЛЕР ЛАБ.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактулоза+Парафин жидкий+Парафин мягкий белый
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 35 г+42.91 г+21.45 г/100 г
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Лактулоза+Парафин жидкий+Парафин мягкий белый

Состав

Активные вещества: парацетамол 500 мг, дифенгидрамина гидрохлорид 25 мг. Вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, магния стеарат, повидон, крахмал прежелатинизированный, кремния диоксид, карбоксиметилкрахмал натрия, стеариновая кислота. Оболочка таблетки: гипромеллоза, триацетин, масло минеральное, титана диоксид, магния силикат, краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый желтый.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Комбинированный слабительный препарат. Благодаря комбинации активных веществ слабительный эффект обусловлен двумя механизмам. Лактулоза увеличивает гидратацию и объем содержимого толстой кишки посредством осмотического действия. Парафин жидкий и парафин мягкий белый действуют как механическое слабительное, размягчая и разжижая содержимое толстой кишки. Действие препарата продолжается 6-8 ч. Лактулоза - синтетический дисахарид, проникает, не всасываясь и без изменений через верхние отделы ЖКТ. В толстой кишке активируется местной сахаролитической флорой и трансформируется в органические кислоты (молочную и уксусную), которые выводятся через кишечник. Парафин жидкий и парафин мягкий не абсорбируются. Начальная терапия: по 1 мерной ложке 1-2 раза/сут. Дозу можно увеличить до 3 раз в зависимости от полученного результата. Поддерживающая терапия: 1-3 мерные ложки в сут. 5 мл геля (1 мерная ложка) = 1.75 г лактулозы и 3.2 г парафина мягкого белого и парафина жидкого. Продолжительность лечения - не более 8 дней. Максимальная суточная доза - 15 мл (3 мерные ложки) = 5.25 г лактулозы + 9.75 г парафина мягкого белого и парафина жидкого. 1 мерная ложка = 1 чайная ложка

Показания

Симптоматическое лечение запора

Способ применения и дозы

Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от результата лечения. Средняя суточная доза составляет 1 мерную ложку 2–3 раза в сутки; поддерживающее лечение - 1–3 мерные ложки в сутки. В случае развития диареи следует снизить дозу препарата

Противопоказания

Органические воспалительные процессы в толстом кишечнике (язвенный ректоколит, болезнь Крона); обтурационный или субобтурационный синдром, боль в животе неизвестного происхождения. Фенилкетонурия (поскольку препарат содержит аспартам (Е951). Детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение при беременности и в период грудного вскармливания

Побочные действия

Вздутие живота, полужидкий стул. Эти симптомы могут наблюдаться в начале лечения и исчезают при подборе индивидуальной дозы препарата. Редко - зуд, боль в анальной области и незначительное снижение массы тела. Применение минеральных масел повышает риск развития анального инфильтрата и иногда вызывает раздражение в перианальной области

Передозировка

Симптомы: диарея. Лечение: приостановить прием препарата

Взаимодействие с другими препаратами

Антибиотики (в т.ч. неомицин) и антациды снижают эффект препарата Трансулоза. Препарат изменяет pH-зависимое высвобождение кишечнорастворимых лекарственных средств

Особые указания

При пропуске приема препарата не нужно принимать двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Не рекомендуется лечение запора в течение длительного времени (более 8 дней) без рекомендации врача. При хронических запорах, а также при запорах, не связанных с изменениями образа жизни, или сопровождающихся болями, повышением температуры тела, вздутием живота препарат следует применять после консультации с врачом. С осторожностью следует применять препарат у больных, соблюдающих постельный режим и у пациентов с нарушениями глотания, поскольку существует риск аспирации минеральных масел в бронхи и развития жировой пневмопатии. После прекращения приема препарата синдром отмены не возникает. Препарат можно назначать больным сахарным диабетом, поскольку в его состав не входит глюкоза. Длительный прием жидкого парафина может снизить абсорбцию жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Лечение включает также: - увеличение в рационе питания количества овощных волокон и напитков; - физическую активность и нормализацию количества дефекаций. Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в этот период возможно только по рекомендации врача. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных. Дети. Не рекомендуется применять у детей