Инструкция по применению
Траумель Гель для наружного применения гомеопатический 100 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачный гель светло-коричневого цвета, возможен желтоватый или зеленоватый оттенок, с характерным запахом. Однородный, без твердых включений, пузырьков воздуха, проступающей жидкости.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Действующими веществами являются Arnica montana, Calendula officinalis, Hamamelis virginiana, Echinacea, Echinacea purpurea, Chamomilla recutita, Symphytum officinale, Bellis perennis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Aconitum napellus, Atropa bella-donna, Mercurius solubilis Hahnemanni, Hepar sulfuris.Каждые 100 г препарата содержат: Arnica montana (Арника монтана) D3 1,5 г, Calendula officinalis (Календула оффициналис) Ø 0,45 г, Hamamelis virginiana (Гамамелис виргиниана) Ø 0,45 г, Echinacea (Эхинацеа) Ø 0,15 г, Echinacea purpurea (Эхинацея пурпурея) Ø 0,15 г, Chamomilla recutita (Хамомилла рекутита) Ø 0,15 г, Symphytum officinale (Симфитум оффицинале) D4 0,1 г, Bellis perennis (Беллис перреннис) Ø 0,1 г, Hypericum perforatum (Гиперикум перфоратум) D6 0,09 г, Achillea millefolium (Ахиллея миллефолиум) Ø 0,09 г, Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D1 0,05 г, Atropa bella-donna (Атропа белладонна) D1 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солублис Ганемани) D6 0,04 г, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D6 0,025 г.Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются вода очищенная, этанол (спирт этиловый) 96% (по объему), карбомер 980, натрия гидроксида раствор 18% (по массе)

Форма выпуска

Гель

Показания

Препарат применяется у взрослых и детей с 3 лет до 18 лет в комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.) и посттравматических состояний (отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений).Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая дозаВзрослым – если не прописано иначе, достаточное количество геля наносить тонким слоем на кожу болезненных областей тела и втирать легкими движениями 2-3- раза в день.Применение у детей и подростковРежим дозирования препарата у детей в возрасте от 3 лет до 18 лет соответствует режиму дозирования у взрослых. Путь или способ введенияДля наружного применения. Возможно наложение марлевой повязки.Продолжительность терапииКурс лечения при посттравматических состояниях – 2 недели и более, при воспалительных заболеваниях – не менее 3-4 недель.Если Вы применили препарата Траумель® больше, чем следовало До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Если Вы применили препарат Траумель® больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.Если Вы забыли применить препарат Траумель®При пропуске приема препарата не удваивайте дозу для компенсации пропущенной.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки

Противопоказания

Не применяйте препарат Траумель®: Если у Вас аллергия на активные компоненты или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша. Если у Вас известная повышенная чувствительность (гиперчувствительность) к Тысячелистнику обыкновенному (Achillea millefolium), Ромашке аптечной (Chamomillarecutita), Ноготкам лекарственным (Calendula officinalis), Маргаритке многолетней (Bellis perennis), Эхинацее (Echinace), Арнике горной (Arnica montana) или иным растениям семейства сложноцветных. Если у Вас туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз,синдромприобретенного иммунного дефицита, вирус иммунодефицита человека и другие аутоиммунные заболевания

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Траумель® может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.При применении геля в отдельных случаях могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции).

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

Перед применением препарата Траумель® проконсультируйтесь с лечащим врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить приемпрепарата и проконсультироваться с врачом.Если симптомы сохраняются или усиливаются на фоне применения препарата в течение 7 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденную кожу.Дети и подросткиНе давайте препарат детям в возрасте от 0 до 3 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (безопасность и эффективность применения препарата у детейв возрасте до 3 лет не установлены)Управление транспортными средствами и работа с механизмамиЛекарственный препарат Траумель® не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечениясрока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и тубе «Годен до...».Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Хранить при температуре не выше 30 °С.Хранить 1 год после вскрытия тубы.