Инструкция по применению
Траумель гель 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Описание

Косметическое средство, предназначенное для улучшения состояния кожи после эстетических процедур.Благодаря экстрактам арники, календулы, гамамелисаи и ромашки обладает успокаивающим и восстанавливающим кожу эффектами. Траумель® Космо гель разработан специально для использования в период заживления и восстановления кожи после эстетических манипуляций (чистка лица, мезотерапия, биоревитализация, инъекционные процедуры) для помощи в устранении следующих неприятных последствий: покраснение, раздражение, отечность, гематомы, воспалительные реакцииТраумель® Космо гель безопасен как для немедленного применения на поврежденные области, так и для длительного ухода за проблемной кожей.Он подойдет людям со склонностью к воспалению кожного покрова и возникновению прыщей.При регулярном применении может помочь улучшить состояние кожи со следами постакне - атрофическими последствиями угревой сыпи.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Препарат Траумель® содержитДействующими веществами являются Arnica montana, Calendula officinalis, Hamamelis virginiana, Echinacea, Echinacea purpurea, Chamomilla recutita, Symphytum officinale, Bellis perennis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Aconitum napellus, Atropa bella-donna, Mercurius solubilis Hahnemanni, Hepar sulfuris.Каждые 100 г препарата содержат: Arnica montana (Арника монтана) D3 1,5 г, Calendula officinalis (Календула оффициналис) ? 0,45 г, Hamamelis virginiana (Гамамелис виргиниана) ? 0,45 г, Echinacea (Эхинацеа) ? 0,15 г, Echinacea purpurea (Эхинацея пурпурея) ? 0,15 г, Chamomilla recutita (Хамомилла рекутита) ? 0,15 г, Symphytum officinale (Симфитум оффицинале) D4 0,1 г, Bellis perennis (Беллис перенис) ? 0,1 г, Hypericum perforatum (Гиперикум перфоратум) D6 0,09 г, Achillea millefolium (Ахиллея миллефолиум) ? 0,09 г, Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D1 0,05 г, Atropa bella-donna (Атропа бела-донна) D1 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солублис Ганемани) D6 0,04 г, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D6 0,025 г.Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются вода очищенная, этанол (спирт этиловый) 96% (по объему), карбомер 980, натрия гидроксида раствор 18% (по массе).

Форма выпуска

Гель

Показания

Препарат применяется у взрослых и детей с 3 лет до 18 лет в комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.) и посттравматических состояний (отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений). Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.Рекомендуемая дозаВзрослым – если не прописано иначе, достаточное количество геля наносить тонким слоем на кожу болезненных областей тела и втирать легкими движениями 2-3- раза в день.Применение у детей и подростковРежим дозирования препарата у детей в возрасте от 3 лет до 18 лет соответствует режиму дозирования у взрослых. Путь или способ введенияДля наружного применения.Возможно наложение марлевой повязки.Продолжительность терапииКурс лечения при посттравматических состояниях – 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3-4 недель.Если Вы забыли применить препарат Траумель®При пропуске приема препарата не удваивайте дозу для компенсации пропущенной.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к тысячелистнику обыкновенному, ромашке аптечной, ноготкам лекарственным, маргаритке многолетней, эхинацее, арнике горной или иным растениям семейства сложноцветных. Повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту. Не применяйте препарат Траумель®: Если у Вас аллергия на активные компоненты или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.Если у Вас известная повышенная чувствительность (гиперчувствительность) к Тысячелистнику обыкновенному (Achillea millefolium), Ромашке аптечной (Chamomilla recutita), Ноготкам лекарственным (Calendula officinalis), Маргаритке многолетней (Bellis perennis), Эхинацее (Echinace), Арнике горной (Arnica montana) или иным растениям семейства сложноцветных.Если у Вас туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, синдром приобретенного иммунного дефицита, вирус иммунодефицита человека и другие аутоиммунные заболевания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность и грудное вскармливаниеЕсли Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Траумель® может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.При применении геля в отдельных случаях могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции).Сообщение о нежелательных реакцияхЕсли у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы применили препарата Траумель® больше, чем следовалоДо настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Если Вы применили препарат Траумель® больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

Перед применением препарата Траумель® проконсультируйтесь с лечащим врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.Если симптомы сохраняются или усиливаются на фоне применения препарата в течение 7 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденную кожу.Дети и подросткиНе давайте препарат детям в возрасте от 0 до 3 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 3 лет не установлены)

Условия хранения

В сухом месте