Инструкция по применению
ТРАВИСИЛ ТАБЛ.Д/РАССАС. ЛИМОН N16



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Плетхико Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фитопрепарат с отхаркивающим действием
Количество в упаковке: 16
Срок годности: 36

Действующее вещество

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Состав

1 таб. сухой экстракт листьев юстиции адатоды (Justicia adhatoda) 5 мг сухой экстракт плодов перца длинного (Piper longum) 25 мг сухой экстракт плодов перца черного (Piper nigrum) 20 мг сухой экстракт корневищ имбиря лекарственного (Zingiber officinale) 12 мг сухой экстракт корней солодки голой (Glycerrhiza glabra) 10 мг сухой экстракт плодов эмблики лекарственной (Emblica officinalis) 16 мг сухой экстракт корневищ куркумы длинной (Curcuma longa) 15 мг сухой экстракт коры акации катеху (Acacia catechu) 17 мг сухой экстракт плодов фенхеля обыкновенного (Foeniculum vulgare) 18 мг сухой экстракт листьев, корней, семян базилика священного (Ocimum sanctum) 5 мг сухой экстракт плодов терминалии чебула (Terminalia chebula) 5 мг сухой экстракт плодов терминалии белерика (Terminalia belerica) 5 мг сухой экстракт корневищ альпинии лекарственной (Alpinia officinarum) 20 мг сухой экстракт семян абруса молитвенного (Abrus precatorius) 20 мг ментол 2 мг. Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза жидкая, масло лимонное.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Трависил таблетки для рассасывания не предоставлены.

Показания

— симптоматическая терапия при заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Таблетки предназначены для рассасывания в полости рта. Детям в возрасте от 6 до 12 лет препарат назначают по 1 таб. 3 раза/сут; детям в возрасте старше 12 лет и взрослым – по 1-2 таб. 3 раза/сут. Курс лечения 2-3 недели. Увеличение продолжительности лечения и проведение повторных курсов терапии возможно только в некоторых случаях по рекомендации врача.

Противопоказания

— детский возраст (до 6 лет) — повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуют одновременное применение Трависила с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Условия хранения

В сухом месте