Инструкция по применению
Травоген Крем 1% 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Германия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Изоконазол
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородный, непрозрачный крем от белого до слегка желтоватого цвета.

Действующее вещество

Изоконазол

Состав

100 г крема содержат: действующее вещество: изоконазола нитрат микронизированный 1,0 г, вспомогательные вещества: полисорбат 60 3,5 г, сорбитана стеарат 1,0 г, цетостеариловый спирт 5,0 г, парафин жидкий 10,0 г, парафин мягкий белый 10,0 г, вода очищенная 69,5 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Изоконазола нитрат быстро проникает в кожу, максимальная концентрация в роговом слое и в нижележащих слоях эпидермиса достигается уже через 1 ч после нанесения препарата (высокая концентрация сохранялась не менее 7 ч). Концентрация в глубоких слоях эпидермиса выше, чем минимальная подавляющая концентрация для дерматофитов. При наружном применении концентрация изоконазола нитрата в эпидермисе выше, чем в дерме и подкожной клетчатке. При нанесении на кожу системная абсорбция незначительна.

Показания

Поверхностные грибковые поражения кожи, в том числе с локализацией в складках кожи, межпальцевых промежутках, паховой области, области наружных половых органов, Эритразма.

Способ применения и дозы

Наружно. Крем Травоген наносят 1 раз в день на поражённые участки кожи. Обычная продолжительность наружной терапии грибковых инфекций составляет 2-3 недели, в случае плохо поддающихся терапии инфекций (особенно в области межпальцевых промежутков) - 4 недели. Возможно проведение и более длительного курса лечения. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжать еще в течение 2 недель после разрешения клинических проявлений. Лечение препаратом Травоген у детей проводится под наблюдением врача. Коррекция режима дозирования не требуется.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любым вспомогательным веществам.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности возможно в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода. Не установлено, проникает ли изоконазол в грудное молоко, поэтому препарат не следует наносить на молочные железы перед кормлением. При необходимости применения препарата решить вопрос с врачом о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Наиболее часто наблюдаемые в клинических исследованиях нежелательные реакции включали раздражение и жжение в области нанесения крема Травоген на кожу. Частота нежелательных реакций определяется в соответствии с правилами оценки частоты ВОЗ: часто (от ⩾ 1/100 до Общие реакции Часто: раздражение и жжение в месте нанесения. Нечасто: сухость и зуд в месте нанесения. Редко: припухлость и трещины в месте нанесения. Частота неизвестна: эритема и везикулы в месте нанесения. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей Нечасто: мокнущая экзема, дисгидроз, контактный дерматит Частота неизвестна: аллергическая кожная реакция Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о передозировке не имеется. В связи с низкой токсичностью изоконазола нет оснований ожидать риска острой интоксикации после применения препарата в высокой дозе или непреднамеренного приёма внутрь.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследования по взаимодействию не проводились.

Особые указания

При нанесении крема Травоген на кожу лица необходимо избегать попадания препарата в глаза. Во время лечения рекомендуется соблюдать правила личной гигиены. При нанесении крема Травоген на область наружных половых органов и использовании во время лечения барьерных средств контрацепции риск разрыва презерватива или диафрагмы увеличивается, так как входящие в состав препарата жидкий парафин и вазелин могут вызвать повреждения контрацептивных изделий из латекса, что приведет к снижению их эффективности. Необходимо использовать надежные методы контрацепции. При появлении аллергических реакций или раздражения в месте нанесения препарата лечение прекращают. Цетилстеариловый спирт, входящий в состав препарата может вызвать развитие контактного дерматита. При отсутствии эффекта при лечении следует обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.